



أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يلي :

١. إذا كان $٢٧ = (س) + ٣هـ = (س) - ٢س$ وكان $هـ = (٢) = ٤$ ، فإن $٧ = (٢)$

٧- ☐ (أ) ٥- (ب) ٥ (ج) ٧ (د)

٢. إذا كان $ص = س١$ ، $س \neq ٠$ فإن $\frac{س}{س١} =$

٢- (أ) ١- (ب) ١- (ج) ١ (د)

٣. إذا كانت $ص = (١ - س٣)$ ، فإن $\frac{س}{س١} /$ تساوي :

٧- (أ) ٤٢- (ب) ٣٥- (ج) ٣٠ (د)

٤. إذا كان $٧ = (٢) = ٣$ ، $٤ = (٢) = هـ$ ، $س١ = ٢ + ٢$ فإن $(٢ \times هـ) = (٢)$

٢٥ (أ) ٢٥- (ب) ٣٦- (ج) ٣٦ (د)

٥. إذا كان $٧ = (س) = ٢$ فإن $\sqrt{س} = (٤)$

١ (أ) ١ (ب) ١ (ج) ٢ (د)

٦. إذا كان $٧ = (س) = س١$ ، وكان $٧ = (٢) = ٦٠$ فإن قيمة الثابت أ تساوي

٥ (أ) ٥- (ب) ١٠ (ج) ١٠- (د)

٧. إذا كان $٧ = (٧) = ٥$ ، $هـ = (٧) = ٢$ ، $٧ = (٧) = ٣$ ، $هـ = (٧) = ١$ فما قيمة

$(٧ \times ٣ \times ٢) =$

٦٦ (أ) ٦- (ب) ٦ (ج) ١٨- (د)

٨. إذا كان $٧ = (س) = س١ + ٧$ ، $هـ = (س) = ٣ - ٢$ فإن $\frac{(٣) = (٣) = هـ}{(٣)}$

٢- (أ) ٦- (ب) ٥ (ج) ١٧- (د)

٩. إذا كان $٧ = (س) = س١$ ، وكان $٧ = (٣) = ٢$ ، $٧ = (٣) = ١$

١- (أ) ١٢ (ب) ١٩ (ج) ١٧ (د)

١٠. إذا كان $u = \sqrt{s}$ ، فما قيمة $u - (1)$

- (أ) $\frac{1}{3}$ (ب) $\frac{1}{3}$ (ج) ١ (د) ١ -

١١. إذا كان $u = \frac{s^2 + 2}{s}$ ، هـ (س) $\neq 0$ وكان هـ $(1) = 6$ ، هـ $(1) = 3$ فما قيمة

- $u - (1)$ (أ) $\frac{3}{4}$ (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) $\frac{1}{12}$ (د) صفر

١٢. إذا كان هـ (س) $3s^2 - 1s^3$ ، وكانت هـ $(1) = 6$ فما قيمة الثابت أ ؟

- (أ) صفر (ب) ٢ - (ج) ٤ - (د) ٤

١٣. إذا كان هـ (س) $2 = u + 1s^3$ ، وكان u (س) هـ (س) اقترانين قابلين للإشتقاق ، حيث هـ $(1) = 3$ ، $u - (1) = 6$ فما قيمة أ ؟

- (أ) ٥ - (ب) ٣ - (ج) ٣ (د) ٥

١٤. إذا كان $u = 1 - 4s$ ، هـ (س) $6 = \frac{u(s)}{s}$ وكان $2 = \frac{u(s)}{s}$ فما قيمة ب ؟

- (أ) ٨ - (ب) ٢ - (ج) ٣ - (د) ٣

١٥. إذا كان $u = 2 - \sqrt{5}$ فإن $u - (1, 0, 1)$ تساوي

- (أ) ١٠٠ (ب) صفر (ج) $\sqrt{5}$ (د) غير ذلك

١٦. إذا كان $u = \sqrt{s^5}$ فإن $u - (1) =$

- (أ) $\frac{5}{3}$ (ب) صفر (ج) $\frac{1}{3}$ (د) $\frac{1}{12}$

١٧. إذا كان الإقتران $u = \frac{64}{5} s^5$ فإن $u - (س)$ هو :

- (أ) $64s^6$ (ب) $64s^6$ (ج) $64s^6$ (د) $64s^6$

سؤال تميز : إذا كان الإقتران $u = 1s^3 + 2s + ب$ ، وكان منحناه يمر بالنقطة $(2, 3)$ ، ما

ميل المستقيم المار بالنقطتين $(1, 1)$ ، $(3, 3)$ علماً بأن $u - (1) = 8$ ؟

بالتوفيق للجميع

المعلمة : صابرين زعاقيق

دائرة عمل (٢) - الثاني عشر الأذني
تعريف المستقيم وقواعد الاستقام

السؤال الأول: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يلي:

١. إذا كان 2 م (دس) + 3 م (دس) = 2 م وكان 2 م = 4 م، فإن 2 م = 4 م

(٢) - ١٧ (ب) - ٥ (ج) - ٥ (د) - ٧

الحل: 2 م = 2 م (دس) + 3 م (دس) = 2 م
 2 م = 2 م (دس) + 3 م (دس) = 2 م
 2 م = 2 م (دس) + 3 م (دس) = 2 م

@. صابر بن محمد زعاقيق

2 م = 2 م (دس) + 3 م (دس) = 2 م
 2 م = 2 م (دس) + 3 م (دس) = 2 م

2 م = 2 م (دس) + 3 م (دس) = 2 م

٢. إذا كان 2 م = 2 م، فإن 2 م = 2 م؟

(٢) - ١٧ (ب) - ٥ (ج) - ٥ (د) - ٧

الحل: 2 م = 2 م
 2 م = 2 م (دس) + 3 م (دس) = 2 م

٣. إذا كانت 2 م = 2 م (دس) + 3 م (دس) = 2 م، فإن 2 م = 2 م؟

(٢) - ١٧ (ب) - ٥ (ج) - ٥ (د) - ٧

الحل: 2 م = 2 م (دس) + 3 م (دس) = 2 م
 2 م = 2 م (دس) + 3 م (دس) = 2 م

استقام الفرصه

$$\frac{5}{\sqrt{5}} = \frac{\text{الأول} \times \text{الثاني} + \text{الثاني} \times \text{الثالث}}{\text{الثاني} \times \text{الثالث} + \text{الثالث} \times \text{الرابع}} = \frac{3 \times (1-3) + 3 \times (1-3)}{3 \times (1-3) + 3 \times (1-3)} = \frac{5}{\sqrt{5}}$$

$$w \times (1 - r - xw) + w \times (1 - r - xw) = \underline{\underline{1 \text{ wps}}}$$

$$\Sigma r = 91 = 91 - 0 = 91 \quad 9 \times 7 \times 7 \times 4$$

[illegible]

$\boxed{27} \quad 27 \quad 27 \quad 27 \quad 27$

$$(f)'_S \times (f)'_H + (f)'_H \times (f)'_S = (f)'_H \times (f)'_S$$

$$7 = 3 + 4 = (3) \cdot 1, \quad 3 \times 7 + 4 \times 4 =$$

$(W7) = 55 + 15 =$

$$③ = 2 \times 5 = 10$$

۵. إذا كان $m = 2$ فإن $f(x) =$

$$154 = \frac{100}{2} \left(\frac{1}{2} \right) \quad (P)$$

الحال: $\frac{1}{y} \cdot (-y) = -1$

م. (س) = $\frac{1}{x} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ @. صابرین محمد زعاقیق

$$f(s) - \frac{1}{s} \leq f(s) = \frac{1}{s} \leq f(s) - \frac{1}{s}$$

$$\frac{1}{5} = \frac{1 - (5)^{-5}}{5 - 1} = \frac{1 - \frac{1}{3125}}{4} = \frac{\frac{3124}{3125}}{4} = \frac{3124}{12500}$$

٦. إذا كان ϕ (س) = $\frac{1}{s}$ ، وكان ϕ (٢) = $\frac{1}{2}$ ، فإن صحة العبارة ٢

1. () 1. () 0. () 0. ()

الحل: $P_n = (n-1)$

$$\sum x p x w = (5) 10$$

$$P = P \leftarrow P \frac{15}{15} = \frac{7}{15}$$

(P)
D/3

~~$$\left[\frac{1}{2} \right] \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \Delta 2$$~~

$$\frac{0}{3} - \sqrt{1} = (1) \cdot 2 \Rightarrow 9 - 1$$

9. A = (1)



ف (رسول) - ح - ز - ج - ع - د

$$21 - 19 = 2$$

5

[illegible]

~~_____~~

$$C + CXC + C^2P = 14$$

 ε- ε-

فد (س) - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹

$$\rho_{\text{CIPW}} = 1$$

$S = \dots$

[illegible]

$P = 5$

$$\omega + 5 \times 1 = 4 -$$

17- 17-

Figure 1



لتحميل المزيد من موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة

<http://www.sh-pal.com>

تابعنا على صفحة الفيس بوك: www.facebook.com/shamela.pal

تابعنا على قنوات التلجرام: www.sh-pal.com/p/blog-page_42.html

أقسام موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة:

الصف الأول: www.sh-pal.com/p/blog-page_24.html

الصف الثاني: www.sh-pal.com/p/blog-page_46.html

الصف الثالث: www.sh-pal.com/p/blog-page_98.html

الصف الرابع: www.sh-pal.com/p/blog-page_72.html

الصف الخامس: www.sh-pal.com/p/blog-page_80.html

الصف السادس: www.sh-pal.com/p/blog-page_13.html

الصف السابع: www.sh-pal.com/p/blog-page_66.html

الصف الثامن: www.sh-pal.com/p/blog-page_35.html

الصف التاسع: www.sh-pal.com/p/blog-page_78.html

الصف العاشر: www.sh-pal.com/p/blog-page_11.html

الصف الحادي عشر: www.sh-pal.com/p/blog-page_37.html

الصف الثاني عشر: www.sh-pal.com/p/blog-page_33.html

ملازم للمتقدمين للوظائف: www.sh-pal.com/p/blog-page_89.html

شارك معنا: www.sh-pal.com/p/blog-page_40.html

اتصل بنا: www.sh-pal.com/p/blog-page_9.html