

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم

الرياضيات

الأدبي والشرعي

فريق التأليف:

أ. محمد الفراء

أ. رهام مصلح

أ. إيناس زهران (منسقة)



د. نسرین دویکات

أ. قيس شبانة

قررت وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين

تدريس هذا الكتاب في مدارسها بدءاً من العام الدراسي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ م

الإشراف العام

رئيس لجنة المناهج	د. صبري صيدم
نائب رئيس لجنة المناهج	د. بصري صالح
رئيس مركز المناهج	أ. ثروت زيد

الدائرة الفنية

إشراف فني	أ. كمال فحماوي
تصميم فني	صباح الفتياي، منال رمضان
تحكيم علمي	د. عمر غنام
تحرير لغوي	د. سهير قاسم
قراءة:	رابعة حنايشة

متابعة للمحافظات الجنوبية د. سميرة النخالة

الطبعة الثالثة

٢٠٢٢ م / ١٤٤٣ هـ

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

دولة فلسطين

وزارة التربية والتعليم



مركز المناهج

mohe.ps | mohe.pna.ps | mohe.gov.ps

f.com/MinistryOfEducationWzartAltrbytWaltlym

+970-2-2983250 هاتف | فاكس +970-2-2983280

حي الماصيون، شارع المعاهد

ص. ب 719 - رام الله - فلسطين

pcdc.edu.ps | pcdc.mohe@gmail.com

يتصف الإصلاح التربوي بأنه المدخل العقلاني العلمي النابع من ضرورات الحالة، المستند إلى واقعية النشأة، الأمر الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية والاحتياجات الاجتماعية، والعمل على إرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون، من خلال عقد اجتماعي قائم على الحقوق والواجبات، يتفاعل المواطن معها، ويعي تراكيبها وأدواتها، ويسهم في صياغة برنامج إصلاح يحقق الآمال، ويلامس الأماني، ويرنو لتحقيق الغايات والأهداف.

ولما كانت المناهج أداة التربية في تطوير المشهد التربوي، بوصفها علماً له قواعده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن خطة متكاملة عالجت أركان العملية التعليمية التعلمية بجميع جوانبها، بما يسهم في تجاوز تحديات النوعية بكل اقتدار، والإعداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة، دون التورط بإشكالية التشتت بين العولمة والبحث عن الأصالة والانتماء، والانتقال إلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه أكثر إنسانية وعدالة، وينعم بالرفاهية في وطن نحمله ونعظمه.

ومن منطلق الحرص على تجاوز نمطية تلقّي المعرفة، وصولاً لما يجب أن يكون من إنتاجها، وباستحضار وإعٍ لعدد من المنطلقات التي تحكم رؤيتنا للطالب الذي نريد، وللبنية المعرفية والفكرية المتوخاة، جاء تطوير المناهج الفلسطينية وفق رؤية محكومة بإطار قوامه الوصول إلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم، والعلم، والثقافة، والتكنولوجيا، وتلبية المتطلبات الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة، وهو ما كان له ليكون لولا التناغم بين الأهداف والغايات والمنطلقات والمرجعيات، فقد تألفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبيراً عن توليفة تحقق المطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً.

ثمّة مرجعيات تؤطر لهذا التطوير، بما يعزّز أخذ جزئية الكتب المقررة من المنهاج دورها المأمول في التأسيس؛ لتوازن إبداعي خلاق بين المطلوب معرفياً وفكرياً، ووطنياً، وفي هذا الإطار جاءت المرجعيات التي تم الاستناد إليها، وفي طليعتها وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، بالإضافة إلى وثيقة المنهاج الوطني الأول؛ لتوجّه الجهد، وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.

ومع إنجاز هذه المرحلة من الجهد، يغدو إجزاء الشكر للطواقم العاملة جميعها؛ من فرق التأليف والمراجعة، والتدقيق، والإشراف، والتصميم، واللجنة العليا أقل ما يمكن تقديمه، فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير، ونحن واثقون من تواصل هذه الحالة من العمل.

وزارة التربية والتعليم

مركز المناهج الفلسطينية

آب / ٢٠١٨ م

يسرنا أن نقدم لزملائنا المعلمين والمعلمات، ولطلبتنا الأعزاء كتاب الرياضيات للصف الثاني الثانوي الأدبي والشرعي، وفق الخطوط العريضة لوثيقة الرياضيات، والتي تم تطويرها بناءً على التغذية الراجعة والدراسات الهادفة إلى تطوير المناهج الفلسطينية، ومواكبتها لمهارات القرن الحادي والعشرين، مستندين في ذلك لمعايير وطنية ودولية.

لقد اشتمل محتوى الكتاب، على أنشطة وتطبيقات وسياقات حياتية، من أجل إفساح المجال للطلبة للتفكير والإبداع، ولإبراز أهمية الرياضيات في الحياة، وقد تم مراعاة التسلسل المنطقي للمفاهيم والنظريات والتعميمات .

وقد اشتمل الكتاب على أربعة وحدات، هي:

الوحدة الأولى (التفاضل والتكامل) حيث عرضت المفاهيم الآتية: متوسط التغير وقواعد الاشتقاق والقيمة القصوى للإقترانات كثيرة الحدود، ثم ربط التكامل بالتفاضل، والتكامل المحدود وبعض قوانينه.

أما في الوحدة الثانية (المصفوفات) فتم تعريف المصفوفة والعمليات عليها، المحددات والنظير الضربي وحل أنظمة من المعادلات باستخدام المصفوفات.

وفي الوحدة الثالثة (المعادلات والمتسلسلات) استعرضت الوحدة طرق حل المعادلات وكذلك حل بعض المعادلات الأسية واللوغارتمية، والتعرف على أنواع المتسلسلات ومجموعها.

أما الوحدة الرابعة (الاحصاء) فتم عرض العلامة المعيارية، واستخدام الجداول في معرفة المساحة تحت منحنى التوزيع الطبيعي المعياري وتطبيقات حياتية عليها.

نتمنى أن نكون بهذا العمل قد حققنا مطالب عناصر العملية التعليمية كافة، بإخراج منهاج فلسطيني واقعي، يربط الطالب بظواهر رياضية حياتية، آمليين من زملائنا المعلمين والمعلمات والمديرين والمديرات في مدارس الوطن، تقديم التغذية الراجعة لمركز المناهج قبل تطبيق الكتاب المقرر، وأثناء تطبيقه في الميدان، وبعد التطبيق.

والله ولي التوفيق

المحتويات

التفاضل والتكامل	٤	Rate Of Change	(١ - ١) متوسط التغير
	١٠	First Derivative	(٢ - ١) المشتقة الأولى
	١٤	Derivative Rules	(٣ - ١) قواعد الاشتقاق
	٢٠	Extreme Values	(٤ - ١) القيم القصوى للإقتران
	٢٥	Indefinite Integral	(٥ - ١) التكامل غير المحدود
	٣١	Definite Integral	(٦ - ١) التكامل المحدود
	٣٨	Chapter Exercises	(٧ - ١) تمارين عامة
المصفوفات	٤٣	Matrix	(١ - ٢) المصفوفة
	٤٩	Matrix Operations	(٢ - ٢) العمليات على المصفوفات
	٥٨	Matrix Multiplication	(٣ - ٢) ضرب المصفوفات
	٦٣	Matrix Inverse	(٤ - ٢) النظير الضربي للمصفوفة المربعة من الرتبة الثانية
	٦٩	Cramer`s Rule	(٥ - ٢) حل نظام من معادلتين خطيتين باستخدام قاعدة كرامر
	٧٣	Chapter Exercises	(٦ - ٢) تمارين عامة
المعادلات والمتسلسلات	٧٧	Exponent Equations	(١ - ٣) المعادلات الأسية
	٨٠	Logarithmic Equations	(٢ - ٣) المعادلات اللوغاريتمية
	٨٣	Series	(٣ - ٣) المتسلسلات
	٨٧	Arithmetic Series	(٤ - ٣) المتسلسلة الحسابية
	٩٣	Chapter Exercises	(٥ - ٣) تمارين عامة
الإحصاء	٩٧	Standard Score	(١ - ٤) العلامة المعيارية
	١٠٢	Standard Normal Distribution	(٢ - ٤) التوزيع الطبيعي المعياري
	١٠٨	Chapter Exercises	(٣ - ٤) تمارين عامة





الوحدة



التفاضل والتكامل

Differentiation and Integration



أفكر وأناقش:

كيف يمكن حساب مساحة الزجاج اللازم لصناعة باب للمدخل الرئيسي للمتحف؟



يتوقع من الطلبة بعد الإنتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على توظيف مبادئ التفاضل والتكامل في الحياة العملية من خلال الآتي:

١. إيجاد متوسط التغير للاقتران ق(س).
٢. إيجاد ميل القاطع لمنحني الاقتران ق(س) المارّ بنقطتين تقعان على ذلك المنحنى.
٣. التعرف على مفهوم المشتقة الأولى للاقتران ق(س).
٤. استخدام قواعد الاشتقاق في إيجاد المشتقة الأولى للاقتران ق(س).
٥. تحديد مجالات التزايد والتناقص للاقتران ق(س) في مجاله.
٦. تعيين القيم القصوى المحلية للاقتران ق(س) في مجاله وتحديد نوعها.
٧. التعرف على مفهوم التكامل.
٨. إيجاد التكامل غير المحدود.
٩. استخدام خصائص التكامل المحدود في إيجاد التكاملات المختلفة.

متوسط التغير



نشاط (١)



يعدّ الزيت الفلسطيني من أجود أنواع الزيوت على مستوى العالم، ويشكّل دعامة اقتصادية للعائلة الفلسطينية.

يرصد الجدول أدناه إنتاج فلسطين من الزيتون، والزيت المستخرج في عامي ٢٠١٣ م و ٢٠١٤ م، كما وردت من جهاز الإحصاء المركزي.

كمية الزيتون وكمية الزيت المستخرج منه في العامين ٢٠١٣ م و ٢٠١٤ م (الكميات بالطن)

السنة	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	التغير بين العامين
س كمية الزيتون	٦٦٠٠٠	١٠١٠٠٠	٣٥٠٠٠
ص كمية الزيت المستخرج	١٨٠٠٠	٢٥٠٠٠	_____

التغير في كمية الزيتون بين عامي (٢٠١٣ م) و (٢٠١٤ م) يساوي ٣٥٠٠٠ طن.

التغير في كمية الزيت المستخرج بين عامي (٢٠١٣ م) و (٢٠١٤ م) يساوي _____.

تعريف



إذا كان $ص = ق(س)$ اقتراناً، وتغيرت $س$ من $س_١$ إلى $س_٢$ فإن:

التغير في قيمة $س = س_٢ - س_١$ ، ويرمز له بالرمز $\Delta س$

التغير في قيمة $ص = ص_٢ - ص_١ = ق(س_٢) - ق(س_١)$ ويرمز له بالرمز $\Delta ص$

نشاط (٢)



أجدُ التغير في s عندما تتغير قيمة s من $s_1 = 1$ إلى $s_2 = 4$.

$$\Delta s = s_2 - s_1 = \dots$$

مثال (١)



إذا كان $v = c(s)$ ، $s_1 = 2$ ، وكانت $s_2 = 1$ ، فما قيمة التغير في قيمة v ؟

الحل:

$$\Delta s = s_2 - s_1$$

$$s_2 - s_1 = 1 - 2$$

$$s_2 = 3$$

$$\Delta v = c(s_2) - c(s_1) = c(3) - c(2)$$

$$= (2-5) - (1-5) \quad (\text{لماذا؟})$$

$$= 3 - 13$$

$$= -10$$

أنافش: ما التغير في قيمة v عندما يكون قيمة التغير في s يساوي ١؟ (في المثال ١)

تعريف



إذا كان $c(s)$ اقتراناً، وتغيرت s من s_1 إلى s_2 فإن:

$$\text{متوسط التغير للاقتران } c(s) = \frac{\Delta v}{\Delta s} = \frac{v_2 - v_1}{s_2 - s_1} = \frac{c(s_2) - c(s_1)}{s_2 - s_1}, \quad s_2 \neq s_1$$

مثال (٢)



أحسب متوسط التغير في الاقتران $ق(س) = س^٢ + ٥$ ، عندما تتغير $س$ في $[٣, ٥]$.

الحل:

$$ق(٣) = ٥ + ٣^٢ = ١٤$$


$$ق(٥) = ٥ + ٥^٢ = ٣٠$$

$$\frac{ق(٣) - ق(٥)}{٣ - ٥} = \frac{ص_١ - ص_٢}{س_١ - س_٢} = \text{متوسط التغير للاقتران}$$

$$\frac{١٤ - ٣٠}{٢} =$$

$$= ٨$$

المفهوم الهندسي لمتوسط التغير:



إذا قطع المستقيم $ل$ منحنى $ق(س)$ في

النقطتين $(س١, ق(س١))$ ، $(س٢, ق(س٢))$

فإن ميل المستقيم القاطع $ل$ يساوي

$$\text{متوسط التغير} = \frac{\Delta ص}{\Delta س} = \frac{ق(س١) - ق(س٢)}{س١ - س٢}$$

مثال (٣)



أجد ميل القاطع لمنحنى الاقتران ق(س) الممثل بالشكل المجاور.

الحل:

من الرسم:

$$ق(١) = ٣$$

$$ق(٩) = ٨$$

$$\text{ميل القاطع} = \frac{ق(س_١) - ق(س_٢)}{س_١ - س_٢} = \frac{ق(١) - ق(٩)}{١ - ٩} = \frac{٣ - ٨}{١ - ٩} = \frac{٥}{٨}$$

إذن ميل القاطع لمنحنى الاقتران ق(س) يساوي $\frac{٥}{٨}$

مثال (٤)



إذا قطع المستقيم ل منحنى الاقتران ق(س) في النقطتين $أ(٦، -٤)$ ، $ب(٢، ٠)$ ، فما متوسط التغير للاقتران ق(س)؟

الحل:

$$\text{متوسط التغير} = \frac{\Delta ق}{\Delta س} = \frac{ق(س_١) - ق(س_٢)}{س_١ - س_٢}$$

$$= \frac{ص_١ - ص_٢}{س_١ - س_٢}$$

$$= \frac{٠ - ٦}{٢ - -٤}$$

$$= \frac{٦}{٦} = ١$$



مثال (٥)



إذا كان هـ (س) = ٢ق (س) + ٤، وكان متوسط تغير الاقتران ق (س) على [٣، ٧] يساوي ١٠، أجد متوسط التغير للاقتران هـ (س) على الفترة ذاتها.

الحل:

$$\frac{ق(٣) - ق(٧)}{٣ - ٧} = \text{متوسط التغير للاقتران ق (س)}$$
$$١٠ =$$

$$\frac{هـ(٣) - هـ(٧)}{٣ - ٧} = \text{متوسط التغير للاقتران هـ (س)}$$

$$\frac{(٢ق(٣) + ٤) - (٢ق(٧) + ٤)}{٣ - ٧} =$$

$$\frac{٢ق(٣) - ٢ق(٧)}{٣ - ٧} =$$

$$٢ \left(\frac{ق(٣) - ق(٧)}{٣ - ٧} \right) =$$

$$١٠ \times ٢ =$$

$$٢٠ =$$

تمارين ومسائل (١ - ١)



١ أجد متوسط التغير في كل من الاقترانات الآتية عندما تتغير s من s_1 إلى s_2 .

أ) $q(s) = 2s - 6$ ، $s_1 = 0$ ، $s_2 = 3$.

ب) $h(s) = s^2 + 2$ ، $s_1 = 2$ ، $s_2 = 5$.


ج) $l(s) = \sqrt{s+2}$ ، $s_1 = 1$ ، $s_2 = 6$.

٢ يقطع المستقيم l منحنى الاقتران $q(s)$ في النقطتين $(1, 2)$ ، $(4, 4)$ ، فإذا كان ميله يساوي 3 ، أجد قيمة الثابت c .

٣ إذا كان متوسط تغير الاقتران $q(s)$ في $[2, 4]$ يساوي 5 ، أجد متوسط تغير الاقتران $h(s) = 3q(s) - 2$ في تلك الفترة.

٤ إذا كان متوسط تغير الاقتران $q(s) = s^2 - 5s$ في $[1, 3]$ يساوي -9 ، أجد قيمة الثابت a ؟

٥ إذا كان $q(3) = 8$ ، وكان متوسط التغير في الاقتران $q(s)$ عندما تتغير s من $s_1 = 3$ إلى $s_2 = 5$ يساوي -2 ، أجد $q(5)$.



٦ يمثل الشكل المجاور منحنى $q(s)$ على الفترة $[-6, 2]$ احسب ميل القاطع الذي يمر بنقطتين $(-6, q(-6))$ و $(2, q(2))$

المشتقة الأولى

نشاط (١)

تعدّ الضرائب من مصادر التمويل الأساسية لأنشطة الدولة ونفقاتها. وقد تم إقرار ضريبة الدخل على الأفراد من خلال توزيعهم في شرائح ضريبية، حيث تكون ضريبة الدخل ٥٪ على الأفراد الذين ينحصر دخلهم السنوي بين (١-١٥) ألف دينار، في حين لم تقر في فلسطين ضريبة على الهدايا أو الميراث.

مقدار الضريبة على ميراث قدره ١٢٣٠ ديناراً يساوي صفراً (لماذا)؟

$$\text{مقدار ضريبة الدخل على } ١٠٠٠ \text{ دينار} = \frac{٥}{١٠٠} \times ١٠٠٠ = ٥٠ \text{ ديناراً.}$$

$$\text{مقدار ضريبة الدخل على } ٢٤٠٠ \text{ دينار} = \frac{٥}{١٠٠} \times ٢٤٠٠ = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$\text{مقدار ضريبة الدخل على } ١٢٠٠٠ \text{ دينار} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

وبالرموز: إذا كانت (ص) مقدار الضريبة المفروضة على الدخل الذي مقداره (س) حيث $١٠٠٠ \leq س \leq ١٥٠٠٠$ فإن:

$$ص = \left(\frac{٥}{١٠٠} \right) \times س، \text{ لاحظ أنه مهما اختلف المبلغ تبقى القيمة } \frac{٥}{١٠٠} \text{ ثابتة. (لماذا)؟}$$

تعريف *

إذا كان $ص = ق(س)$ معرّفاً عند $س = م$ ، وكانت $هـ$ $ق(م) + (هـ) - ق(م)$ موجودة، فإن $ق(س)$ يكون قابلاً للاشتقاق عند $س = م$ وتسمى المشتقة الأولى للاقتان $ق(س)$ عند $س = م$.

$$\text{ويرمز لها بالرمز } ق'(م) \text{ أو } \frac{دص}{دس} \bigg|_{س=م} \text{ أو } ص'_م$$

قاعدة (١): إذا كانت $ص = ق(س) = م$ ، حيث $م$ عدد حقيقي، فإن $ق'(س) = \frac{دص}{دس} = \text{صفر}$.

قاعدة (٢): إذا كانت $ص = م + س$ ، حيث $م$ ، $ب$ عدداً حقيقيين، فإن $ق'(س) = \frac{دص}{دس} = م$.

* تعريف المشتقة الأولى للعلم فقط.

مثال (١)



أجدُ مشتقة كل من الاقترانات الآتية:

أ) ق(س) = ٩٨ ب) ص = ٥س ج) ٢ص = ٤ - س

الحل:

أ) ق(س) = ٩٨ (اقتران ثابت)

إذن: ق = (س) = صفر.

ب) ص = ٥س (اقتران خطي)

إذن: $\frac{ص}{س} = ٥$

ج) ٢ص = ٤ - س

ص = ٢ - س ومنها $\frac{ص}{س} = ٢ - ١ = ١$

قاعدة (٣): إذا كان ق(س) = س^١، فإن ق(س) = س^١، حيث:
ن عدد حقيقي، ن ≠ ٠، س ≠ ٠.

مثال (٢)



أجدُ مشتقة الاقتران ق(س) = س^٥ عند النقطة (-٢، -٣٢).

الحل:

ق(س) = س^٥ = س^٥

ق(-٢) = (-٢)^٥

١٦ × ٥ =

٨٠ =



نشاط (٢)



إذا كان $q(s) = \sqrt[2]{s}$ فإيجاد $q(-8)$:

$$q(s) = \sqrt[2]{s}$$

$$q(s) = s^{\frac{1}{2}} \quad (\text{لماذا؟})$$

$$\text{ومنها } q(s) = s^{\frac{1}{2}} = s^{\frac{2}{4}}$$

$$= \frac{1}{s^{\frac{2}{4}}} =$$

$$\text{ومنها } q(-8) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

قاعدة (٤): إذا كان $q(s)$ اقترانا قابلاً للاشتقاق، وكان p عدداً حقيقياً، $p \neq 0$ ، فإن الاقتران $h(s) = p \cdot q(s)$ هو اقتران قابل للاشتقاق، وتكون $h(s) = p \cdot q(s)$.

مثال (٣)



إذا كان $h(s) = 5q(s)$ ، وكان $q(6) = 1$ ، فما قيمة $h(6)$ ؟

الحل:

$$h(s) = 5q(s)$$

$$h(s) = 5q(s)$$

$$h(6) = 5 \times q(6)$$

$$\text{ومنها } h(6) = 5 \times 1 = 5$$

تمارين ومسائل (١ - ٢)



أجد مشتقة كل من الاقتارات الآتية عند قيمة س المقابلة لكل منها:

عند $s = 100$

أ) $Q(s) = \sqrt[5]{2-s}$

عند $s = 12$

ب) $V = s^3$

عند $s = 7$

ج) $K(s) = s$

عند $s = 1$

د) $Q(s) = \sqrt[3]{s^2}$

عند $s = 1$

هـ) $Q(s) = s^3$

أجد $Q'(s)$ لكل من الاقتارات الآتية:

أ) $Q(s) = \frac{64}{s^5}$ ، $s \neq 0$ ، صفر

ب) $Q(s) = (0.003)^s$

ج) $Q(s) = 5s^5$

إذا كان $V = Q(s)$ ، وكان $Q'(5) = 7$ ، أجد قيمة $\frac{dV}{ds}$ عند $s = 5$


إذا كان $Q(s) = s^2$ ، وكان $Q'(2) = 60$ ، فما قيمة الثابت k ؟

قواعد الاشتقاق

نشاط (١)



اعتاد الفلسطيني منذ القدم تجميع مياه الأمطار في فصل الشتاء عن أسطح المنازل في بئرٍ يُلحِقُهُ بيته. وتشكل هذه العملية جزءاً من الحصاد المائي الذي يقوم به الفلسطيني للتغلب على مشكلة نقص المياه في فصل الصيف. يمثل الشكل المجاور سطح أحد المنازل.



مساحة سطح المبنى = $(س^2) + (_____)$

كمية المياه المتجمعة (م^٢) في العام ٢٠١٦ م تعطى بالعلاقة:

مساحة سطح المبنى (م^٢) × معدل سقوط الامطار العام (م) × ٠,٨

إذا كان معدل سقوط الامطار عام ٢٠١٦ م يساوي ٠,٤٠٤ م،

فإن كمية المياه المتجمعة عن سطح البيت = _____.

كيف يمكن اشتقاق هذه العلاقة؟

قاعدة (١)*: إذا كان ق(س) و ه(س) اقترانين قابلين للاشتقاق، وكان ك(س) = ق(س) ± ه(س) فإن:

الاقتران ك(س) يكون قابلاً للاشتقاق، ويكون ك'(س) = ق'(س) ± ه'(س).

وبلغة أخرى: (ق + ه)'(س) = ق'(س) + ه'(س)

مثال (١)



إذا كان ق(س) = س^٥، وكان ه(س) = س^٤، أجد:

أ) (ق + ه)'(س)

ب) (ق - ه)'(١)

الحل:

ق'(س) = ٥س^٤. كما أن: ه'(س) = ٤س^٣

* يمكن تعميم القاعدة لأكثر من اقترانين.

أ) بحسب القاعدة: (ق + هـ) (س) = ق (س) + هـ (س)

ومنها: (ق + هـ) (س) = ١٠س + ١٢س^٢ (لماذا؟)

$$\text{ب) ق (١) = (١) ١٠ = ١٠}$$

$$\text{هـ (١) = (١) ١٢ = ١٢}$$

وبما أن (ق - هـ) (س) = ق (س) - هـ (س)

فإن: (ق - هـ) (١) = ق (١) - هـ (١) = (١٠) - (١٢)

$$= -٢$$

نشاط (٢)



إذا كان ق (س) = ٦س^٢ + ٥س - ٧، فإن:

$$\text{ق (س) = ٦} \times (٢س) + ٥ = \text{(لماذا؟)}$$

$$\text{ق (٣) = } \underline{\hspace{2cm}}.$$

نشاط (٣)



إذا كان ق (س) = ك (س) - م (س) + ٧ حيث: ك (س) = ٣س^٣ + ٢، م (س) = ٣س + ٢، فإن:

$$\text{ك (س) = ٩س^٢}$$

$$\text{م (س) = ٣}$$

$$\text{ق (س) = ك (س) - م (س) = ٢م (س)}$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$\text{ومنها: ق (٢-) = } \underline{\hspace{2cm}}.$$

■ أفكر: أجد ق (س)، حيث ق (س) = (٢س + ١) × (س)

قاعدة (٢): إذا كان ق(س) ، ه(س) اقترانين قابلين للاشتقاق عند س = ١ فإن:

$$(ق \times ه)(١) = ق(١) \times ه'(١) + ه(١) \times ق'(١).$$

وبالكلمات:

مشتقة حاصل ضرب اقترانين = الاقتران الأول $\times$ مشتقة الاقتران الثاني + الاقتران الثاني $\times$ مشتقة الاقتران الأول

مثال (٢)



ق(٢-)	ق'(٢-)	ه(٢-)	ه'(٢-)
٥	-٤	-١	٧

اعتمد المعطيات في الجدول المجاور لإيجاد (ق $\times$ ه)'(٢-)

الحل:

مشتقة حاصل ضرب اقترانين = الاقتران الأول $\times$ مشتقة الاقتران الثاني + الاقتران الثاني $\times$ مشتقة الاقتران الأول

$$(ق \times ه)'(٢-) = ق(٢-) \times ه'(٢-) + ه(٢-) \times ق'(٢-)$$

$$٥ \times -٤ + -١ \times ٧ =$$

$$= -٣٩$$

نشاط (٤)



إذا كان ق(س) = (٣س^٢ - ٥س) (٧-٤س) فإن ق'(س) تساوي:

ق'(س) = الاقتران الأول $\times$ مشتقة الاقتران الثاني + الاقتران الثاني $\times$ مشتقة الاقتران الأول

$$ق'(س) = (٣س^٢ - ٥س) (٤ - ٧) + (٧ - ٤س) (٦س - ٥)$$

ومن هنا ق'(٢) = _____

_____ =

قاعدة (٣): إذا كان ق(س)، ه(س) اقترانين قابليين للاشتقاق، وكان ه(س) $\neq 0$ عند $s = p$ فإن:

$$\left(\frac{ق}{ه} \right)'(p) = \frac{ه'(p) \times ق(p) - ق'(p) \times ه(p)}{ه^2(p)}$$
 ، وبالكلمات:

$$\frac{(\text{المقام} \times \text{مشتقة البسط}) - (\text{البسط} \times \text{مشتقة المقام})}{\text{مربع المقام}} = \text{مشتقة ناتج قسمة اقترانين}$$

مثال (٣)



إذا كان ك(س) = $\frac{ق(س)}{ه(س)}$ ، وكان:

$$ق(١٠) = ٢ ، ق'(١٠) = ٣- ، ه(١٠) = ٢- ، ه'(١٠) = ١٧ ، أجد ك'(١٠) .$$

الحل:

$$ك'(س) = \left(\frac{ق(س)}{ه(س)} \right)' = \frac{ه'(س) \times ق(س) - ق'(س) \times ه(س)}{ه^2(س)}$$

$$ك'(١٠) = \frac{ه'(١٠) \times ق(١٠) - ق'(١٠) \times ه(١٠)}{ه^2(١٠)}$$

$$= \frac{(١٧ \times ٢) - (٣- \times ٢-)}{٤}$$

$$= \frac{٢٨-}{٤}$$

$$= ٧-$$

مثال (٤)



إذا كان $Q(s) = \frac{3 - s^4}{s^2 - 6}$ ، $s \neq 3$ ، أتحقق أن $Q(1) = \frac{9}{8}$

الحل:

$$Q(s) = \frac{(\text{المقام} \times \text{مشتقة البسط}) - (\text{البسط} \times \text{مشتقة المقام})}{\text{مربع المقام}}$$

$$Q(s) = \frac{(s^2 - 6)(-4s^3) - (3 - s^4)(2s)}{(s^2 - 6)^2}$$

$$Q(1) = \frac{(-4)(1) - (3 - 1)(2)}{(1 - 6)^2}$$

$$\frac{9}{8} = \frac{18}{16} =$$

تمارين ومسائل (١ - ٣)



١ بالاعتماد على البيانات في الجدول

المجاور أحسب ما يأتي:

ق(٥)	ق(٥)	ق(٥)	هـ(٥)
٩	٢	٣	١-

أ (ق + هـ) (٥)

ب (٣ ق - هـ) (٥)

ج ($\frac{ق}{هـ}$) (٥)

د (ق × هـ) (٥)

٢ إذا كان ق(س) = س^٢ + ٧ ، هـ(س) = ٣ - س^٣ ، أجد:

أ (ق + هـ) (١)

ب ($\frac{ق}{هـ}$) (س)

ج $\frac{ق(س)}{هـ(س)}$

د (ق × هـ) (٢)

هـ ق (٢) × هـ (٢)

و (س^٢ × ق(س)) (٢-)

٣ إذا كان (ق × هـ) (٧) = ١٢ ، ق(٧) = ٣ ، ق(٧) = ٦ ، هـ(٧) = ٣ أجد هـ (٧)

٤ إذا كان (ق ÷ هـ) (٩) = ٣ ، ق(٩) = ٥ ، ق(٩) = ١٢- ، هـ(٩) = ٣- أجد هـ (٩)

أجد هـ (٩) ، علماً بأن هـ(س) ≠ صفر


٥ إذا كان ق(س) = س^٢ + ٦س - ٥ ، وكان ق(٣) = ٠ ، فما قيمة الثابت ؟

٦ إذا كان ق(س) = س^٢ - ٢س + ٣ ، هـ(س) = س^٢ - ٢ ، وكان (ق × هـ) (١) = ٨ ، أجد قيمة الثابت أ.

٧ إذا كان ق(س) = $\frac{س - ٥}{٦ - ٤س}$ ، وكان ق(١) = $\frac{١}{٢}$ ، فما قيمة الثابت ؟

القيم القصوى للإقتران

نشاط (١)



تعدّ الكهرباء مطلباً أساسياً في حياة المواطنين. فدونها تتعطل الكثير من الفعاليات. ويتم رصد استهلاك الكهرباء في فلسطين على مدار الساعة. الشكل المجاور يوضح توزيع الأحمال اليومية من الكهرباء في منطقة القدس وضواحيها في اليوم الأول من عام ٢٠١٨ م.

- ألاحظ أن الأحمال تتزايد من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً، كذلك من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة مساءً.
- تتناقص أحمال الكهرباء خلال الفترة _____.

تعريف



يكون الإقتران $Q(S)$ متزايداً على الفترة $[a, b]$ ، إذا كان: لكل $S_1 < S_2$ ، فإنّ:

$$Q(S_1) < Q(S_2)$$


ولأيّ عددين S_1, S_2 ، $S_1 \in [a, b]$.

ويكون $Q(S)$ متناقصاً على الفترة $[a, b]$ ، إذا كان: لكل $S_1 < S_2$ ، فإنّ $Q(S_1) > Q(S_2)$ لأيّ عددين S_1, S_2 ، $S_1 \in [a, b]$.

أذكر:

تسمى الزاوية التي يصنعها المماس مع الاتجاه الموجب لمحور السينات عند أي نقطة (S, V) زاوية ميل المماس (هـ). فإذا كانت الزاوية (هـ) حادة يكون الميل موجباً. وإذا كانت الزاوية (هـ) منفرجة يكون الميل سالباً.

ملاحظة: ستقتصر الدراسة في هذا السياق على الإقترانات كثيرة الحدود من الدرجة الثالثة على الأكثر.




نشاط (٢)

يوضح الشكل المجاور منحنى الاقتران ك(س) = $s^2 - 2s + 3$ المعروف على ح.

- المماس (١) يصنع زاوية منفرجة (هـ) مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، لذا فإن إشارة ميله سالبة في الفترة $]-\infty, 1[$.
- ألاحظ أن ك(س) متناقص في الفترة $]-\infty, 1[$.

- المماس (٢) يصنع زاوية _____ (هـ) مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، لذا فإن إشارة ميله _____ في الفترة $[1, \infty)$.

ألاحظ أن ك(س) متزايد في الفترة $[1, \infty)$. (لماذا)



قاعدة *: إذا كان ق(س) معرفاً على الفترة $[a, b]$ ، فإن ق(س) يكون:

- ١) متزايداً في الفترة $[a, b]$ ، إذا كانت ق(س) < 0 لكل س في الفترة $[a, b]$.
- ٢) متناقصاً في الفترة $[a, b]$ ، إذا كانت ق(س) > 0 لكل س في الفترة $[a, b]$.
- ٣) ثابتاً في الفترة $[a, b]$ ، إذا كانت ق(س) = 0 لكل س في الفترة $[a, b]$.

مثال (١)

أحدد فترات التزايد والتناقص للاقتران ق(س) = $s^2 + 4s - 7$ ، $s \in \mathbb{R}$

الحل: نجد ق(س) فتكون:


$$ق(س) = s^2 + 4s - 7$$

نضع ق(س) = 0 ونحل: $s^2 + 4s - 7 = 0$

$$s = -2 \text{ أو } s = 3$$

* لا يطلب من الطالب التحقق هندسياً من التزايد والتناقص.

أبحث في إشارة ق (س) في جوار س = ٢-



أتعلم

يكون للاقتران ق (س) المعروف على ح قيمة قصوى (عظمى أو صغرى) محلية عند $s = p$ ، إذا كان:
١. ق (p) = صفرًا. ٢. يغير ق (س) من سلوكه حول $s = p$ من التزايد إلى التناقص أو العكس.

مثال (٢)

أجد القيم القصوى المحلية للاقتران هـ (س) = $s^2 - 27s$ ، $s \in \mathbb{R}$ ، إن وجدت، وأحدد نوعها.


الحل:

$$\text{هـ (س)} = s^2 - 27s$$

$$\text{هـ (س)} = 0 \quad (\text{لماذا؟})$$

$$s^2 - 27s = 0 \quad \text{ومنها (س - 27) (س) = 0}$$

$$s = 27 \quad \text{أو} \quad s = 0 \quad (\text{لماذا؟})$$



من إشارة هـ (س) يتضح أن الاقتران هـ (س) قد غيّر من سلوكه، حول $s = 27$ من التزايد إلى التناقص.

إذن للاقتران هـ (س) قيمة عظمى محلية عند $s = 27$ ، وقيمتها هـ (27) = -٥٤.


كما أن هـ(س) غير سلوكه من التناقص إلى التزايد حول $s = 3$.

إذن للاقتزان هـ(س) قيمة صغرى محلية عند $s = 3$ وقيمتها هـ(3) = -0.54.

نشاط (3)



الشكل الآتي يمثل إشارة مشتقة الاقتزان هـ(س) المعروف على ح.



أ) هـ(س) = صفر عند $s =$ _____ و عند $s =$ _____.


ب) هـ(س) متناقص في الفترة $(-\infty, 0]$.

ج) هـ(س) متزايد في الفترة _____.

د) هـ(3-) لا تعتبر قيمة صغرى، لأن _____.

هـ) تعتبر هـ(0) _____.

تمارين ومسائل (١ - ٤)



١ أجد القيم العظمى والصغرى المحلية للاقتران هـ(س) المرسوم في الشكل المجاور.

٢ إذا كان ق(س) = $3s^3 + 6s^2 - 1$ ، س $\exists$ ح، أجد:

أ) فترات التزايد والتناقص للاقتران ق(س) على ح.
ب) القيم القصوى للاقتران ق(س)، وأحدد نوع كل منها.

٣ ما قيمة الثابت جـ في الاقتران ق(س) = $5 - 5s - s^2$ ، والتي تجعل ق(٢) قيمة عظمى محلية.

٤ ما فترات التزايد والتناقص للاقتران هـ(س) = $(2 + s) \times (2 - s - 4)$.

٥ أجد فترات التزايد والتناقص للاقتران ك(س) = $\frac{1}{3}s^3 + 2s^2 - 5s - 5$ ، س $\exists$ ح، وما القيم القصوى (العظمى والصغرى) للاقتران ك(س)؟ وما نوع كل منها؟

٦ أبين أنه لا يوجد للاقتران ع(س) = $2s^2 + 2$ قيم قصوى في مجاله.

التكامل غير المحدود

نشاط (١)

تُولد الشعوب حرّةً بطبيعتها، ولأسبابٍ مختلفة تطمع جماعات خارجية بمقدّراتها، فتتحول من حالة الإستقلال إلى حالة الاحتلال. لكنها حالة لا تدوم، فالشعوب تقاوم وتحارب لتستقل من جديد. ويضرب الشعب الفلسطيني أقوى الأمثلة على ذلك.

الاحتلال عكس الاستقلال

كما الهدم عكس _____.

وعملية الطرح عكس _____.

وتعتبر عملية التكامل، في إحدى صورها، عملية عكسية للتفاضل، وهذا يعني أنه يمكن معرفة عائلة الاقترانات $ق(س)$ ، إذا عُرفت $ق(س)$.

نشاط (٢)

إذا كان $ق(س)$ اقتراناً، حيث أن مشتقته $ق'(س) = ٢س$ ، فإن قاعدة $ق(س)$ يمكن أن تكون:

$$ق_١(س) = ٢س$$

$$ق_٢(س) = ٢س + \text{_____}$$

$$ق_٣(س) = ٢س + \frac{١}{٣}$$

إذن الصورة العامة للاقتران هي $ق(س) = \text{_____}$.

نشاط (٣)

إذا كان $ق(س) = ٧$ ، فإن قاعدة الاقتران $ق(س)$ ، من خلال خبرتك في التفاضل، قد تكون:

$$ق(س) = ٧س - ٢$$

أو $ق(س) = \text{_____}$. من هنا جاءت أهمية تعريف عملية التكامل كعملية عكسية للتفاضل.

قاعدة (٢): $\left[s^{\frac{n}{3}} s^{\frac{1+n}{3}} \right] = s^{\frac{1+n}{3}} + s^{\frac{n}{3}}$ ، حيث n ، s عدنان حقيقيان، $n \neq 1$

مثال (٢)

أجد كلاً من التكاملين الآتيين:

(أ) $\int s^2 s^3 ds$ (ب) $\int \sqrt[3]{s} s^2 ds$

الحل:

(أ) $\int s^2 s^3 ds = \int s^{1+3} ds = \int s^4 ds = \frac{1}{5} s^5 + C$

(ب) $\int \sqrt[3]{s} s^2 ds = \int s^{\frac{1}{3}} s^2 ds = \int s^{\frac{1}{3}+2} ds = \int s^{\frac{7}{3}} ds = \frac{3}{10} s^{\frac{10}{3}} + C$

$\frac{3}{4} s^{\frac{4}{3}} + C =$

نشاط (٥)

أجد قاعدة الإقتران $q(s)$ الذي مشتقته $Q(s) = \sqrt[3]{s}$ ، علماً بأن $Q(1) = 1$

$Q(s) = \sqrt[3]{s} \Rightarrow Q'(s) = \frac{1}{3} s^{-\frac{2}{3}}$

$\int \frac{1}{3} s^{-\frac{2}{3}} ds =$

لكن $Q(1) = 1$ ومنها $C =$ _____ .

اذن قاعدة الاقتران $Q(s) =$ _____ .

قاعدة (٣): إذا كان ق(س) ، ه(س) إقترايين قابلين للتكامل فإن:

$$\int (ق \pm ه) دس = \int ق(س) دس \pm \int ه(س) دس$$

مثال (٣)

أجد كلاً من التكاملين الآتيين:

$$\text{أ) } \int (س^٣ + س) دس \quad \text{ب) } \int (س^٤ - \sqrt{س}) دس$$

الحل:

$$\text{أ) } \int (س^٣ + س) دس = \int س^٣ دس + \int س دس$$

$$= \frac{س^٤}{٤} + \frac{س^٢}{٢} + ج$$

$$\text{ب) } \int (س^٤ - \sqrt{س}) دس = \int س^٤ دس - \int \sqrt{س} دس$$

$$= \frac{س^٥}{٥} - \frac{س^{\frac{٣}{٢}}}{\frac{٣}{٢}} + ج$$

نشاط (٦)

$$\text{أ) } \int (س^٣ + س^٥) دس = \int س^٣ دس + \int س^٥ دس = \frac{س^٤}{٤} + \frac{س^٦}{٦} + ج$$

$$\text{ب) } \int \left(\frac{١}{س} + ٥ \right) دس = \dots$$

تمارين ومسائل (٥ - ١)



أحسب كلاً من التكاملات الآتية:

١

أ) $\int (3s^2 + 4s - 5) ds$ ب) $\int s^{\frac{2}{5}} ds$ ج) $\int \sqrt{s^7} ds$


د) $\int (s^6 + \frac{2}{s^5}) ds$ هـ) $\int (6s^5 + 7s^2 + 3s^3) ds$ و) $\int (5)^{s^2} ds$

٢ إذا كان $Q(s) = \int (s^4 - 8s^3 + 1) ds$ ، أجد $Q(1)$.

٣ إذا كان $\int Q(s) ds = s^3 + 2s + 3$ ، أجد $Q(s)$.

٤ إذا كان $V = \int (s^2 + 3) ds$ ، أجد $\frac{dV}{ds}$.

التكامل المحدود



أولاً: التكامل المحدود

نشاط (١)

عملت وزارة الصحة الفلسطينية على نشر مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف القرى، والتجمعات السكانية. من أهداف هذه المراكز متابعة نمو الأطفال. وذلك من خلال متابعة التغير في طول الطفل. الشكل المجاور يوضح منحنى سرعة نمو الأطفال من سن صفر إلى ١٨ عاماً. ويمثل هذا المنحنى مشتقة منحنى النمو للأطفال. بالاستعانة بالرسم نجد أن:

سرعة نمو طفل في عمر سنتين يساوي _____ سم/سنة.

سرعة نمو طفل في عمر ٩ سنوات يساوي _____ سم/سنة.

أناقش

كيف يمكن معرفة مقدار التغير في نمو طفل بين سن ٢ - ٩ سنوات؟

نشاط (٢)

يُراد حساب التغير في الاقتران $Q(s)$ الذي تعطى مشتقته بالقاعدة $Q'(s) = 2s - 6$ ، عندما تتغير s من $s_1 = 2$ إلى $s_2 = 5$. لإيجاد التغير في الاقتران، نحتاج لقاعدة الاقتران $Q(s)$.

$$Q(s) = \int Q'(s) ds$$

$$Q(s) = \int (2s - 6) ds = s^2 - 6s + C$$

$$\text{التغير في } Q(s) = Q(s_2) - Q(s_1)$$

$$ق(٥) = (٥)^٢ - ٦(٥) + ج.$$

$$ق(٢) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

إذن: مقدار التغير = ق(٥) - ق(٢)

$$\underline{\hspace{2cm}} = ق(٢) - ق(٥)$$

تعريف



التكامل المحدود: إذا كان ق(س) اقتراناً قابلاً للاشتقاق، فإن: $\int_a^b ق(س) دس = ق(س) \Big|_a^b = ق(ب) - ق(أ)$ ، حيث أ: الحد الأدنى، ب: الحد الأعلى، أ، ب عدنان حقيقيان.

مثال (١)



أحسب قيمة كل من التكاملين الآتيين:

$$(١) \int_0^2 (٥ + ٢س) دس$$

$$(٢) \int_{-١}^1 (٦س^٢ - ٧) دس$$

الحل:

$$(١) \int_0^2 (٥ + ٢س) دس = ق(س) \Big|_0^2 = (٥س + س^٢) \Big|_0^2$$

$$= (١٠ + ٤) - (٠) = ١٤$$

$$(٢) \int_{-١}^1 (٦س^٢ - ٧) دس = ق(س) \Big|_{-١}^1 = (٢س^٣ - ٧س) \Big|_{-١}^1$$

$$((1-)^7 - ^2(1-)^2) - ((1)^7 - ^2(1)^2) =$$

$$0 - 0 =$$

$$10 =$$

مثال (٢)



إذا كانت $Q(S)$ مشتقة الاقتران $Q(S)$ ، وكان $Q(1-) = 0$ ، $Q(2) = 7$ ، أجد $\int_{1-}^2 Q(S) dS$.

الحل:

$$\int_{1-}^2 Q(S) dS = \int_{1-}^2 Q(S) dS \quad (\text{لماذا؟})$$

$$\int_{1-}^2 Q(S) dS =$$

$$2(Q(2) - Q(1-)) =$$

$$4 = (0 - 7)2 =$$

■ أفكر: إذا كان $\int_{2-}^3 S^2 dS$ ، أجد $\frac{dS}{dS}$.

أتعلم



مشتقة التكامل المحدود تساوي صفراً دائماً.

مثال (٣)



إذا كان $\int_B^6 (4S + 3) dS = 90$ فما قيمة الثابت B ؟

الحل:

$$\int_B^6 (4S + 3) dS = \int_B^6 (2S^2 + 3S) dS \quad (\text{لماذا؟})$$

$$= ق(٦) - ق(ب)$$

$$٩٠ = (٣ + ٢ب) - ((٦) ٣ + (٣٦)(٢)) =$$

$$٩٠ = (٣ + ٢ب) - ٩٠ =$$

$$\text{إذن: } ب = ٠ \text{ أو } ب = \frac{٣-}{٢} \text{ (لماذا؟)}$$

ملاحظة: تنطبق جميع قواعد التكامل غير المحدود على التكامل المحدود.

ثانياً: خصائص التكامل المحدود

نشاط (٣)

$$\int_٦^٦ (٨ + ٢س) دس =$$

$$=$$

أستنتج أن: _____

أتعلم

$$\int_٦^٦ ق(س) دس = \text{صفر، حيث: } ب \text{ عدد حقيقي}$$

مثال (٤)

$$\text{ما قيمة } \int_٣^٤ (٤ - س) دس$$

$$\text{الحل: } \int_٣^٤ (٤ - س) دس = \text{صفر، لأن الحد الأعلى يساوي الحد الأدنى.}$$

نشاط (٤)



إذا كان $\left[\begin{smallmatrix} ١ & ٢ \\ ٣ & ٤ \end{smallmatrix} \right] \text{ ق (س) دس} = \left[\begin{smallmatrix} ١ & ٢ \\ ٣ & ٤ \end{smallmatrix} \right] \text{ ق (س) دس} + \text{ج}$ ، أكمل الجدول الآتي:

التكامل الأول	قيمة التكامل الأول	التكامل الثاني	قيمة التكامل الثاني
الحالة الأولى	$\left[\begin{smallmatrix} ١ & ٢ \\ ٣ & ٤ \end{smallmatrix} \right] \text{ ق (س) دس}$	$\left[\begin{smallmatrix} ١ & ٢ \\ ٣ & ٤ \end{smallmatrix} \right] \text{ ق (س) دس}$	
الحالة الثانية	$\left[\begin{smallmatrix} ١ & ٢ \\ ٣ & ٤ \end{smallmatrix} \right] \text{ ق (س) دس}$	$\left[\begin{smallmatrix} ١ & ٢ \\ ٣ & ٤ \end{smallmatrix} \right] \text{ ق (س) دس}$	١٦

أقارن بين قيمة التكاملين في كل حالة.

أستنتج أن: _____.

أتعلم



$$\left[\begin{smallmatrix} ١ & ٢ \\ ٣ & ٤ \end{smallmatrix} \right] \text{ ق (س) دس} = \left[\begin{smallmatrix} ١ & ٢ \\ ٣ & ٤ \end{smallmatrix} \right] \text{ ق (س) دس}$$

مثال (٥)



إذا كان $\left[\begin{smallmatrix} ١ & ٢ \\ ٣ & ٤ \end{smallmatrix} \right] \text{ ق (س) دس} = ٩$ فما قيمة $\left[\begin{smallmatrix} ١ & ٢ \\ ٣ & ٤ \end{smallmatrix} \right] \text{ ق (س) دس} + ٧$ ؟

الحل: $\left[\begin{smallmatrix} ١ & ٢ \\ ٣ & ٤ \end{smallmatrix} \right] \text{ ق (س) دس} + ٧ = \left[\begin{smallmatrix} ١ & ٢ \\ ٣ & ٤ \end{smallmatrix} \right] \text{ ق (س) دس} + ٧$

$$= \left[\begin{smallmatrix} ١ & ٢ \\ ٣ & ٤ \end{smallmatrix} \right] \text{ ق (س) دس} + ٧$$

$$= (٢٨ - ٧) + (٩)(٢ - ١) \text{ لماذا؟}$$

$$= ٢١ - ١٨ = ٣٩$$

نشاط (٥)



إذا كان $Q(s) = (s^4 + 1)S$ فإن:

$$أ) \int_{-\infty}^{\infty} (s^4 + 1)S ds = \int_{-\infty}^{\infty} (s^2 + s^2) ds = \int_{-\infty}^{\infty} (s^2 + 1) ds - \int_{-\infty}^{\infty} s^2 ds = 10$$

$$ب) \int_{-\infty}^{\infty} (s^4 + 1)S ds = \int_{-\infty}^{\infty} (s^2 + s^2) ds = \int_{-\infty}^{\infty} (s^2 + 1) ds - \int_{-\infty}^{\infty} s^2 ds = \dots$$

$$ج) \int_{-\infty}^{\infty} (s^4 + 1)S ds = \int_{-\infty}^{\infty} (s^2 + s^2) ds = \int_{-\infty}^{\infty} (s^2 + 1) ds - \int_{-\infty}^{\infty} s^2 ds = \dots$$

أقارن بين إجابتي في الفرعين أ و ب وإجابتي في الفرع ج.

أستنتج أن :

أتعلم



إذا كان $Q(s)$ معرفاً على الفترة $[a, b]$ ، وكان J عدد حقيقي بحيث $a > J > b$ ، فإن:

$$\int_{-\infty}^{\infty} Q(s) ds = \int_{-\infty}^J Q(s) ds + \int_J^{\infty} Q(s) ds$$

وتسمى هذه الخاصية خاصية الإضافة.

مثال (٦)



إذا كان $\int_{-\infty}^{\infty} Q(s) ds = 2$ ، وكان $\int_{-\infty}^{\infty} Q(s) ds = 4$ ، فما قيمة $\int_{-\infty}^{\infty} Q(s) ds$ ؟

$$\text{الحل: } \int_{-\infty}^{\infty} Q(s) ds = \int_{-\infty}^J Q(s) ds + \int_J^{\infty} Q(s) ds$$

$$6 = 4 + 2 =$$

$$\text{اذن: } \int_{-\infty}^{\infty} Q(s) ds = 6 \times 5 = 30$$

تمارين ومسائل (٦ - ١)



١ أحسب كل من التكاملات التالية:

$$\int_{-2}^1 (1 + s) ds \quad \text{ب) } \int_2^0 (s^2 - 7) ds \quad \text{ج) } \int_1^4 (s + \sqrt{s}) ds$$

٢ إذا كان $\int_{-2}^2 (s) ds = 3s^2 - 2s + ج$ ، فما قيمة $\int_{-2}^2 (s) ds$ ؟

٣ إذا كان $\int_1^0 (3هـ(s) ds = 12$ ، ما قيمة $\int_0^1 (هـ(s) + 2س - 1) ds$ ؟

٤ إذا كان $\int_3^0 (س + ٢) ds = 12$ ، فما قيمة الثابت ب؟

٥ إذا كان $\int_{-1}^0 ٦س ds = \text{صفر}$ ، فما قيمة/قيم الثابت ج؟

٦ إذا كان $\int_{-1}^0 (س) ds = 13$ ، $\int_0^{-1} (هـ(s) ds = 7$ ، فما قيمة: $\int_{-1}^0 (٢ق(s) - هـ(s)) ds$ ؟

٧ إذا كان $\int_2^7 (س) ds = 3$ ، وكان $\int_3^7 (س) ds = -9$ ، فما قيمة $\int_2^3 (س) ds$ ؟

تمارين عامة

السؤال الأول: اختر رمز الإجابة الصحيحة:

١. إذا كان $ق(س) = \frac{٢}{س}$ ، $س \neq ٠$ ، فما قيمة $ق(١)$ ؟

- أ) ٨ ب) ٨ ج) ٢ د) ٢-

٢. ما ميل القاطع لمنحنى الاقتران $ق(س) = ٣س^٢ - ٢$ عند $س = ١$ ، $س = ٢$ ؟

- أ) ٣ ب) ٦- ج) ١٢ د) ٩

٣. إذا كان متوسط التغير في الاقتران $ق(س)$ يساوي $\frac{٣}{٢}$ ، وكان $\Delta س = ٦$ ، فما قيمة $\Delta ص$ ؟

- أ) ٩ ب) ٣ ج) ١٨ د) ٦

٤. إذا كان $ق(س) = (١-س)(٢س)$ ؛ فما قيمة $ق(١)$ ؟

- أ) ٨ ب) ١٠ ج) ١٨ د) ٧-

٥. إذا كان $ق(س) = \frac{١ + ٣س^٢}{س - ٢}$ ، $س \neq ٢$ ، فما قيمة $ق(٣)$ ؟

- أ) ٣٧ ب) ٣٧- ج) ١٠ د) ١

٦. إذا كان $Q(7) = 5$ ، $H(7) = 2$ ، $C(7) = 3$ ، $H(7) = 1$ فما قيمة $(2 \times 3 \times H(7))$ ؟

- أ) ٦٦ ب) ٦- ج) ٦ د) ١٨-

٧. إذا كان للاقتزان $Q(س)$ قيمة عظمى محلية عند النقطة $(10, 5)$ ، فما قيمة $Q(10)$ ؟

- أ) ٥ ب) ١٠- ج) صفر د) ٣

٨. إذا كان $\int_1^9 (س) \, ds = 3س^2 - 4س + ج$ ، فما قيمة $Q(2)$ ؟

- أ) ١٢ ب) ٤ ج) ٢- د) ٨

٩. إذا كان $Q(س) = \int_1^9 (5س^2 + 3س - 2) \, ds$ ، فما قيمة $Q(8)$ ؟

- أ) ٢٤ ب) ٤٤ ج) صفر د) ٢

١٠. إذا كان $\int_0^7 Q(س) \, ds = 6$ ، $\int_0^1 Q(س) \, ds = 4$ ، فما قيمة $\int_1^7 (3Q(س) + 2) \, ds$ ؟

- أ) ٣٢ ب) ٩ ج) ٣٣ د) ٣

السؤال الثاني: إذا كان $Q(s) = s^3 - 3s - 6$ ، وكانت $Q(2) = 0$ ، أجد قيمة الثابت a ؟

السؤال الثالث: ما متوسط التغير في الاقتران $Q(s) = \sqrt{s^2 - 2}$ ، عندما تتغير s من $s_1 = 11$ إلى $s_2 = 18$ ؟

السؤال الرابع: إذا كان $Q(s) = s^3 - 12s - 3$ ؛ أجد قيمة / قيم s بحيث $Q(s) = 0$ ؟

السؤال الخامس: إذا كان $Q(s) = \int_b^0 (s^2 + 1) ds = 24$ ، أجد قيمة / قيم الثابت b ؟

السؤال السادس: إذا كان $Q(s) = s^4 - 8s + 1$:

(أ) فما فترات التزايد والتناقص للاقتران $Q(s)$ ؟

(ب) ما القيم القصوى المحلية للاقتران $Q(s)$ ، وما نوعها؟

السؤال السابع: أقيم ذاتي: أكمل الجدول الآتي:

مستوى الانجاز			مؤشر الاداء
مرتفع	متوسط	دون المتوسط	
			حل مسائل على متوسط التغير
			ايجاد مشتقة الاقترانات موظفا القواعد
			تحديد القيم القصوى المحلية للاقترانات
			حل مسائل على التكامل غير المحدود
			توظيف خواص التكامل المحدود في حل مسائل منتمية



الوحدة



المصفوفات Matrices



يعتبر النخيل من الثروات الزراعية الرئيسة في كثير من مناطق فلسطين، ويحرص المزارعون على زراعته في صفوفٍ وأعمدة.... أُنَاقش أهمية هذا النمط بالزراعة.



يتوقع من الطلبة بعد الإنتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على توظيف المصفوفات والعمليات عليها في الحياة العمليّة من خلال الآتي:

١. التّعرف إلى المصفوفة وعناصرها.
٢. إيجاد ناتج جمع مصفوفتين وطرحهما.
٣. إيجاد ناتج ضرب مصفوفتين.
٤. إيجاد النظير الضربيّ للمصفوفة المربعة من الرتبة الثانية.
٥. حلّ معادلات مصفوفيّة باستخدام النظير الضربيّ.
٦. حلّ نظام من المعادلات الخطيّة باستخدام قاعدة كرامر.

المصفوفة

نشاط (١)



يقوم جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني بإجراء التعداد السكاني العام مرة واحدة كل ١٠ سنوات؛ بهدف توفير البيانات الحقيقية حول شتى مناحي حياة الفرد الفلسطيني، ويقوم الجهاز بتحديث سنوي للبيانات من خلال دراسة عينات من كل المحافظات.

كانت بيانات جهاز الإحصاء المركزي حول عدد السكان في بعض المحافظات الفلسطينية حتى نهاية العام ٢٠١٢م (لأقرب ألف) كالآتي: القدس ٣٩٧ ألف، أريحا ٤٨ ألف، غزة ٥٧٠ ألف، أما في عام ٢٠١٤م فتتم تحديث هذه البيانات كالآتي: القدس ٤١٢ ألفاً، أريحا ٥١ ألفاً وغزة ٦٦٧ ألفاً.

- عدد سكان القدس عام ٢٠١٢م يساوي _____ .
- عدد سكان أريحا عام ٢٠١٤م يساوي _____ .
- عدد سكان غزة عام ٢٠١٢م يساوي _____ .

أنظّم هذه البيانات في صفوف وأعمدة كالآتي:

عدد السكان عام ٢٠١٢م	عدد السكان عام ٢٠١٤م
_____	_____
_____	_____
_____	_____

القدس

أريحا

غزة

كيف يمكن ترتيب هذه البيانات في منظومة أخرى؟

تعريف



المصفوفة: هي تنظيم مستطيل الشكل لأعداد حقيقية على هيئة صفوف عددها (م) وأعمدة عددها (ن)، محصورة بين قوسين من النوع []، ويرمز لها بأحد الحروف الهجائية، وتكون المصفوفة من الرتبة م × ن.

نشاط (٢)



$$\begin{bmatrix} ٢ \\ ٠ \\ ٥ \end{bmatrix} = ج, \quad \begin{bmatrix} ٧ & ٠ & ١ \\ ٥ & ٧ & ٤- \\ ١٠ & ٢ & ٠ \end{bmatrix} = ب, \quad \begin{bmatrix} ١ & ٢- \\ ٣ & ٤ \\ ٦ & ٨- \end{bmatrix} = أ$$

أ) رتبة المصفوفة أ تساوي ٢×٣. (لماذا؟)

ب) رتبة المصفوفة ب تساوي _____.

ج) رتبة المصفوفة ج تساوي _____.

د) يقع العدد ٦ في تقاطع الصف الثالث والعمود الثاني في المصفوفة أ، ولذلك يسمى المدخلة $a_{٢٣}$.

■ **أفكر:** أسمى المدخلة التي قيمتها ٨- في المصفوفة أ.

أتعلم



يسمى كل عدد في المصفوفة أ مدخلة، ويرمز له بالرمز a_{ij} ، حيث:
(ي): الصف الذي تقع فيه المدخلة، (هـ): العمود الذي تقع فيه المدخلة.

مثال (١)



$$\begin{bmatrix} ٦ & ٢- \\ ٣ & ٩ \\ ٨- & ٧ \end{bmatrix} = أ$$

إذا كانت المصفوفة أ، فأجيب على الأسئلة الآتية:

أ) ما رتبة المصفوفة أ؟

ب) ما قيمة كل من المدخلات الآتية: $a_{١٢}$ ، $a_{٢١}$ ، $a_{٢٣}$ ؟

ج) أسمى المدخلة التي قيمتها ٣ في المصفوفة أ.

الحل:

أ) رتبة المصفوفة $P = 3 \times 2$.

المدخلة $P = 8$

المدخلة $P = 9$

ب) المدخلة $P = 6$

ج) المدخلة $P = 3$ (لماذا؟)

نشاط (٣)

إذا كانت $P = \begin{bmatrix} 8 & 3 & 5 \\ 9 & 6 & 1 \end{bmatrix}$ ، فإن:

رتبة المصفوفة P تساوي _____.

$$3 = P$$

$$_____ = P$$

$$_____ = P - P$$

نشاط (٤)

اكتب جميع المصفوفات الممكنة، بحيث يكون عدد مدخلاتها أربعة، وقيمة كل منها صفر.

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = _____$$

$$J = _____$$

أتعلم



من أنواع المصفوفات:

مصفوفة الصف:



هي المصفوفة التي تتكوّن من صف واحد فقط، و(ن) من الأعمدة، وتكون رتبته $1 \times n$.

مصفوفة العمود:



هي المصفوفة التي تتكوّن من عمود واحد فقط، و(م) من الصفوف، وتكون رتبته $m \times 1$.

المصفوفة المربعة:



هي المصفوفة التي يتساوى فيها عدد الصفوف مع عدد الأعمدة ويساوي (ن)، وتسمى المصفوفة مربعة من الرتبة النونية.

المصفوفة الصفرية: هي المصفوفة التي تكون كل مدخلة فيها تساوي صفراً، ويرمز لها بالرمز (و).



مثال (٢)



ما رتبة كل من المصفوفات الآتية؟ وما نوعها.

$$س = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} ، ع = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} ، و = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} ، ص = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix}$$

الحل:

(٢) رتبة $ص = 1 \times 3$ ، ص مصفوفة عمود.

(١) رتبة $س = 3 \times 1$ ، وهي مصفوفة صف.

(٤) رتبة $و = 3 \times 3$ ، وهي مصفوفة صفرية.

(٣) ع مصفوفة مربعة من الرتبة الثالثة.

تعريف



تتساوى المصفوفتان $أ$ ، $ب$ إذا كان لهما الرتبة نفسها، وكانت جميع مدخلاتهما المتناظرة متساوية.

مثال (٣)

أبين فيما إذا كانت المصفوفتان متساويتان في كل من الحالات الآتية:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 6 \\ 1 & 7 & 8 \end{bmatrix} \quad , \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 6 \\ 1 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{bmatrix} \quad , \quad D = \begin{bmatrix} 9 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad ؟$$

الحل:

(١) المصفوفتان A، B متساويتان؛ لأن لهما الرتبة نفسها، ومدخلاتهما المتناظرة متساوية.

(٢) المصفوفتان C، D غير متساويتين، لأن رتبة C = ١ × ٣ أما رتبة D = ٣ × ١

مثال (٤)

إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 4 & 2+s \\ 9- & \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} 4 & 9- \end{bmatrix}$ ، فما قيمة s التي تجعل $A = B$ ؟

الحل:

$$\begin{bmatrix} 4 & 2+s \\ 9- & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 9- \end{bmatrix}$$

$$9- = 2+s$$

وبحلّ المعادلة ينتج أن $s = 11-$.

أناقش

إذا كان: $\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 2+s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+s & 2 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$ ، أُبين أن $s=2$ ، $s=2$.

تمارين ومسائل (٢ - ١)



١ ينتج مصنع للأواني الزجاجية ثلاثة أشكال من الصحون: المربع، المستطيل، والدائري. فإذا كان لهذا المصنع فرعين أحدهما في الخليل، والآخر في رام الله، وكان عدد الصحون التي ينتجها كل فرع يومياً كما يأتي:

الخليل: ٥٠٠ صحنٍ مربع الشكل، ٤٧٠ صحنٍ مستطيل الشكل، ٢٣٠ صحنًا دائري الشكل.

رام الله: ٤٠٠ صحنٍ مربع الشكل، ٢٥٠ صحنٍ مستطيل الشكل، ١٨٠ صحنًا دائري الشكل. أكتب البيانات السابقة على شكل مصفوفة من الرتبة 3×2 .

٢ إذا كانت $P = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 4 \end{bmatrix}$ ، $J = \begin{bmatrix} 8 & 3 & 1 \end{bmatrix}$:

أ) فما رتبة كل من المصفوفات السابقة؟

ب) ما نوع كل منها؟

ج) ما قيمة كل من المدخلات الآتية: J_{11} ، P_{12} ، B_{31} ؟

٣ أجد قيم الثابتين ب، ج فيما يأتي:

أ) $\begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 7 & 7 \end{bmatrix}$

ب) $\begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}$

ج) $\begin{bmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 7 & 0 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 6 & 1 \\ 2 & 0 & 8 \end{bmatrix}$

٤ أجد قيمة س، ص حيث:

$\begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$

العمليات على المصفوفات



أولاً: جمع المصفوفات:

نشاط (١)

تمتاز بعض المحافظات الفلسطينية

عن غيرها بالنشاط السياحي، ويعتبر عدد العاملين في الفنادق أحد مؤشرات القوة الاقتصادية لهذا القطاع.

المصفوفتان $P = \begin{bmatrix} 190 \\ 102 \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} 310 \\ 250 \end{bmatrix}$ تمثلان أعداد

العاملين في الفنادق خلال عام ٢٠١٢م، بحسب بيانات جهاز الإحصاء المركزي.

تمثل المصفوفة P عدد العاملين في الفنادق شمال فلسطين. فيما تمثل المصفوفة B عدد العاملين في الفنادق جنوب فلسطين.

الصف الأول في كلا المصفوفتين يمثل عدد الذكور، فيما يمثل الصف الثاني عدد الإناث من العاملين في الفنادق.

عدد العاملين الذكور في جميع فنادق فلسطين عام ٢٠١٢م $= 190 + 310 = 500$ عامل.

عدد العاملات في جميع فنادق فلسطين عام ٢٠١٢م $=$ _____.

تمثل المصفوفة J أعداد العاملين (ذكوراً وإناثاً) في جميع فنادق فلسطين.

$$J = \begin{bmatrix} 500 \\ \text{_____} \end{bmatrix}$$

تعريف

إذا كانت P ، B مصفوفتين كل منهما من الرتبة نفسها $m \times n$ فإن مجموع المصفوفتين $P + B = J$ ، حيث J مصفوفة من الرتبة $m \times n$ ، وتكون كل مدخلة في المصفوفة J مساوية لمجموع المدخلتين المناظرتين لها في المصفوفتين P ، B ، أي أن: $J_{ij} = P_{ij} + B_{ij}$.

نشاط (٢)



إذا كانت $P = \begin{bmatrix} 2 & 8 & 6 \\ 4 & 5 & 9 \end{bmatrix}$ ب $= \begin{bmatrix} 4- & 3 \\ 9- & 5 \end{bmatrix}$ فإن:

رتبة $P = 2 \times 3$

رتبة ب = ____.

أناقش



هل يمكن إجراء العملية $P+B$ ؟ أفسّر _____.

مثال (١)



إذا كانت $P = \begin{bmatrix} 2- & 5 & 8 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 4 & 8- \end{bmatrix}$ ، ب $= \begin{bmatrix} 9 & 1 & 1- \\ 3 & 3 & 3 \\ 4 & 3- & 10 \end{bmatrix}$ ، أجد $A+B$ (إن أمكن).

الحل:

بما أن رتبة المصفوفة $P =$ رتبة المصفوفة ب، فإنه يمكن إجراء عملية الجمع كالآتي.

$$\begin{bmatrix} 9+2- & 1+5 & 1-+8 \\ 3+3 & 3+1 & 3+4 \\ 4+5 & 3-+4 & 10+8- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 1 & 1- \\ 3 & 3 & 3 \\ 4 & 3- & 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2- & 5 & 8 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 4 & 8- \end{bmatrix} = P+B$$

$$= \begin{bmatrix} 7 & 6 & 7 \\ 6 & 4 & 7 \\ 9 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$



نشاط (٣)



$$\text{إذا كانت } P = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 1 & 4 & 6 \end{bmatrix}, \text{ ب } = \begin{bmatrix} 9 & 6 & 4 \\ 1- & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$P + B = \underline{\hspace{10cm}}$$

$$B + P = \underline{\hspace{10cm}}$$

ماذا تلاحظ؟

أتعلم



عملية جمع المصفوفات هي عملية تبديلية.

نشاط (٤)



$$\text{إذا كانت } E = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 8 & 7- \end{bmatrix}, \text{ هـ } = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 3- \end{bmatrix}, \text{ جـ } = \begin{bmatrix} 11 & 5- \\ 3 & 1- \end{bmatrix}$$

$$\text{أ) } \begin{bmatrix} 18 & 2 \\ 11 & 11- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 5- \\ 3 & 1- \end{bmatrix} + \left(\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 3- \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 8 & 7- \end{bmatrix} \right) = \text{جـ} + (\text{هـ} + \text{ع})$$

$$\text{ب) } \underline{\hspace{10cm}} = (\text{جـ} + \text{هـ}) + \text{ع}$$

أقارن بين النتيجةين.

أتعلم



عملية جمع المصفوفات هي عملية تجميعية.

نشاط (٥)



إذا كانت $P = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 7 \end{bmatrix}$ ، و $O = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ فإن:

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 7 \end{bmatrix} = O + P$$

و $P + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$ ماذا تلاحظ؟

أتعلم



المصفوفة الصفرية (O) هي المصفوفة المحايدة لعملية جمع المصفوفات.

ثانياً: ضرب المصفوفات بعدد ثابت:

نشاط (٦)



إذا كانت $P = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 6 \\ 7 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ ، فإن:

$$\underline{\hspace{2cm}} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 6 \\ 7 & 3 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 4 & 6 \\ 7 & 3 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 4 & 6 \\ 7 & 3 & 1 \end{bmatrix} = P + P + P \quad (أ)$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \begin{bmatrix} 3 \times 3 & 3 \times 4 & 3 \times 6 \\ 3 \times 7 & 3 \times 3 & 3 \times 1 \end{bmatrix} = (P \times 3) \quad (ب)$$

٣) أقرن بين الإجابتين.

تعريف



إذا كانت P مصفوفة من الرتبة $m \times n$ ، وكان ج عدداً حقيقياً فإن ج. P مصفوفة من الرتبة $m \times n$ ، حيث تكون كل مدخلة فيها مساوية للمدخلة المناظرة لها في المصفوفة P مضروبة بالثابت ج. أي أن: ج. $(P) = (ج. P)$ (ج. P)

مثال (٢)



إذا كانت $S = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 7 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ ، $V = \begin{bmatrix} 6 & 1 & 0 \\ 4 & 8 & 3 \end{bmatrix}$ أجد كل مما يأتي:

(ب) $\frac{3}{5} V$

(أ) $7S$

الحل:

(أ) $7S = \begin{bmatrix} 21 & 28 & 35 & 42 \\ 7 & 49 & 28 & 7 \end{bmatrix}$

(ب) $\frac{3}{5} V = \begin{bmatrix} \frac{18}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ \frac{12}{5} & \frac{24}{5} & \frac{9}{5} \end{bmatrix}$

أناقش



هل يمكن إجراء العملية الآتية : $S + (-S)$ ؟

ثالثاً: طرح المصفوفات:

تعريف



إذا كانت A ، B مصفوفتين من الرتبة نفسها $m \times n$ ، فإن ناتج طرح المصفوفتين:
 $A - B =$ جـ، حيث جـ مصفوفة من الرتبة $m \times n$. وتكون كل مدخلة في جـ مساويةً لناتج طرح المدخلتين المناظرتين لها في المصفوفتين A ، B ،
 أي أن: جـ $= A - B$

مثال (٣)



أجد ناتج ما يأتي (إن أمكن) :

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 2- \\ 9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix} \quad (١)$$

$$\cdot \begin{bmatrix} 5 & 8 & 4 \\ 8 & 7 & 3- \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} \quad (٢)$$

الحل:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ 1- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & - & 4 \\ 2- & - & 6 \\ 9 & - & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2- \\ 9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix} \quad (١)$$

(٢) لا يمكن إجراء عملية الطرح لأن رتبتي المصفوفتين غير متساويتين.

مثال (٤)



إذا كانت $P = \begin{bmatrix} 3- & 3 \\ 1 & 4- \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} 3 & 3- \\ 1- & 4 \end{bmatrix}$ ، أجد ما يأتي :

$$P + B \quad (٢)$$

$$P + B \quad (١)$$

الحل:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3- \\ 1- & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3- & 3 \\ 1 & 4- \end{bmatrix} = B + P \quad (١)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3- & 3 \\ 1 & 4- \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 3- \\ 1- & 4 \end{bmatrix} = P + B \quad (٢)$$

ماذا تلاحظ؟

أتعلم



إذا كانت P ، B مصفوفتين حيث: $P + B = B + P$ ، فإن B هي النظر الجمعي للمصفوفة P ، وتكون $B = P$.

نشاط (٧)



اعتادت شركة مطاحن القمح الفلسطيني رصد مبيعاتها (بالطن) من الطحين البلدي والطحين الأبيض والنخالة مرة كل ٤ شهور، في خطي الإنتاج التابعين لها.

تمثل المصفوفة $P = \begin{bmatrix} 60 & 50 \\ 20 & 20 \\ 10 & 10 \end{bmatrix}$ ، مبيعات الشركة خلال شهري كانون ثاني وشباط من العام ٢٠١٨ م من خطي الإنتاج معاً.

وتمثل المصفوفة $J = \begin{bmatrix} 130 & 110 \\ 50 & 60 \\ 30 & 30 \end{bmatrix}$ ، مجمل مبيعات الشركة في الأشهر الأربعة الأولى من العام ٢٠١٨ م من خطي الإنتاج معاً.

- أعبّر عن المصفوفة S التي تمثل مبيعات شهري آذار ونيسان معاً بدلالة المصفوفتين P ، J .

- أجد المصفوفة S التي تمثل مبيعات الشركة خلال شهري آذار ونيسان = _____.

مثال (٥)



$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + س$$

أحلّ المعادلة المصفوفية الآتية: س + ٣

الحل:

باستخدام خاصية ضرب المصفوفات بعدد حقيقي فإن:

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & 6 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} + س$$

وبإضافة النظير الجمعي للمصفوفة $\begin{bmatrix} 15 & 6 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$ إلى طرفي المعادلة ينتج:

$$\begin{bmatrix} 15 & 6 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & 6 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 15 & 6 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} + س$$

$$\begin{bmatrix} 18 & 5 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + س$$

(لماذا؟)

$$\begin{bmatrix} 18 & 5 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} = س$$

إذن:

مثال (٦)



$$\begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} + س = \begin{bmatrix} 12 & 9 \\ 0 & 11 \end{bmatrix} - س٣$$

أحلّ المعادلة المصفوفية الآتية: س٣ - س

الحل:

$$\begin{bmatrix} 12 & 9 \\ 0 & 11 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = س٣ - س$$

(لماذا؟)

$$\begin{bmatrix} 20 & 2 \\ 2 & 12 \end{bmatrix} = س٢$$

$$\begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} = س١$$

ومنها س

تمارين ومسائل (٢ - ٢)



١ إذا كان عدد طالبات الفروع: الأدبيّ والرياضيّ والزراعيّ في مدرسة فاطمة الزهراء للبنات ٣٢، ٢٥، ٢٢ على الترتيب، عدد طلاب المدرسة الهاشمية للذكور في نفس الفروع ٣٠، ٢٠، ١٦ على الترتيب. أجب عن الأسئلة الآتية:

(أ) أنظّم بيانات كل مدرسة في مصفوفة عمود.

(ب) ما مجموع طلبة الفرع الزراعيّ في كلا المدرستين؟

(ج) أكتب المصفوفة التي تمثل الزيادة في عدد الطالبات في جميع الفروع عن عدد الطلاب في كلا المدرستين؟

٢ إذا كانت المصفوفة ج = $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ + ب، وكانت المدخلة $p = 9$ ، والمدخلة ب = -8 ، فما قيمة المدخلة ج؟

٣ إذا كانت س = $\begin{bmatrix} 6 & 2 & 3 & 8 \\ 3 & 1 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ ، ص = $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 8 & 6 & 4 & 2 \end{bmatrix}$ ، ع = $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 7 \end{bmatrix}$

أجد ما يأتي (إن أمكن):

(أ) س + ص (ب) ٣س - ٤ص (ج) ٥ص - س (د) س - ٢ع (هـ) ٢ص - ٣س × ٤

٤ أجد ناتج ما يأتي $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 5 & 6 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$

٥ إذا كانت $p = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ ، ب = $\begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$ ، أجد المصفوفة س حيث: ٢س = ٣ - ب

٦ أحلّ كلاً من المعادلات المصفوفية الآتية:

(أ) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} + س = \left(\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} + س \right)$ (ب) $\begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$

(ج) $\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 5 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = ٢س - \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$

ضرب المصفوفات



نشاط (١)



تعتبر تجارة السيارات من المشاريع الرائجة في فلسطين في السنوات الأخيرة. يعرض أحد المعارض ثلاثة أنواع من السيارات. تمثل المصفوفة ب أعداد

$$\begin{bmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 6 & 6 & 6 \\ 8 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

السيارات التي تم باعها المعرض في العامين ٢٠١٥م و ٢٠١٦م.

أما المصفوفة $P = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix}$ فتمثل أسعار تلك السيارات (لأقرب ألف دينار) في ذلك المعرض من كل نوع.

مجموع مبيعات عام ٢٠١٥م $= (8 \times 7) + (6 \times 6) + (5 \times 5) = 117$ ألف دينار، (لماذا؟)

مجموع مبيعات العام ٢٠١٦م = _____ .

المصفوفة ج تمثل مجموع المبيعات في العامين ٢٠١٥م، و ٢٠١٦م، ج = $\begin{bmatrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{bmatrix}$

تعريف



إذا كانت P مصفوفة من الرتبة $m \times n$ ، ب مصفوفة من الرتبة $n \times h$ ، فإن:

$$P \cdot B = \text{ج} = \text{ج}_h, \text{حيث: } \text{ج}_h = P \cdot \text{ب}_1 + P \cdot \text{ب}_2 + \dots + P \cdot \text{ب}_n$$

مثال (١)

أجد ناتج ضرب المصفوفتين P ، B في كل من الحالات الآتية:

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3- & 1 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} = B \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 3 & 4- & 0 \\ 5 & 2 & 1 \end{bmatrix} = P \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} = B \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} = P \quad (2)$$

الحل: ألاحظ أن عدد أعمدة المصفوفة P = عدد صفوف المصفوفة B

$$P \cdot B = \begin{bmatrix} (0 \times 0) + (3- \times 1) + (2 \times 3) & (6 \times 0) + (1 \times 1) + (5 \times 3) \\ (0 \times 3) + (3- \times 4-) + (2 \times 0) & (6 \times 3) + (1 \times 4-) + (5 \times 0) \\ (0 \times 5) + (3- \times 2) + (2 \times 1) & (6 \times 5) + (1 \times 2) + (5 \times 1) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 3 & 16 \\ 12 & 14 \\ 4- & 37 \end{bmatrix}$$

(٢) لا يمكن إجراء عملية الضرب لأن عدد أعمدة المصفوفة $P \neq$ عدد صفوف المصفوفة B .

نشاط (٢)

إذا علمت أن P ، B مصفوفتان حيث: $P_{3 \times 4}$ ، $B_{4 \times 3}$ ، فإن رتبة المصفوفة B تساوي _____.

نشاط (٣)

$$\text{إذا كانت } P = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} ، B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \text{ فإن:}$$

$$P \cdot B = \begin{bmatrix} 4 & 23 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (0 \times 3) + (1 \times 4) & (5 \times 3) + (2 \times 4) \\ (0 \times 1) + (1 \times 2) & (5 \times 1) + (2 \times 2) \end{bmatrix}$$

$B \cdot P =$ _____ . ماذا تلاحظ؟

أتعلم



عملية ضرب المصفوفات ليست تبديلية.

مثال (٢)



إذا كانت $P = \begin{bmatrix} 2 & 10 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} 2- & 1 \\ 10 & 5- \end{bmatrix}$ أجد $P \cdot B$ ؟

الحل:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (10 \times 2) + (2- \times 10) & (5- \times 2) + (1 \times 10) \\ (10 \times 1) + (2- \times 5) & (5- \times 1) + (1 \times 5) \end{bmatrix} = P \cdot B$$

مثال (٣)



إذا كانت $P = \begin{bmatrix} 1- & 7 \\ 2- & 8 \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ أجد ناتج كل من $P \cdot B$ و $B \cdot P$ ؟

الحل:

$$\begin{bmatrix} 1- & 7 \\ 2- & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1- & 7 \\ 2- & 8 \end{bmatrix} = P \cdot B$$

$$B \cdot P = \begin{bmatrix} 1- & 7 \\ 2- & 8 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = B \cdot P$$

ماذا تلاحظ؟

أتعلم



المصفوفة
هي المصفوفة المحايدة لعملية ضرب المصفوفات من الرتبة الثانية، ويرمز لها بالرمز I_2 ، ويطلق عليها أيضاً اسم مصفوفة الوحدة.

نشاط (٤)



إذا كانت $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ، $J = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ فإن:

$$I_2 \cdot (B + J) = \left(\begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right) \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 29 \end{bmatrix}$$

$$I_2 + J = \underline{\hspace{10cm}}$$

ماذا ألاحظ؟

أتعلم



تتوزع عملية ضرب المصفوفات على عملية الجمع، بحيث تكون عمليتا الجمع والضرب معرفتان.

■ أفكر: إذا كانت: $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ ، $J = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ أبين أن:

$$(I_2 \cdot B) \cdot J = J \cdot (B \cdot I_2)$$

تمارين ومسائل (٢ - ٣)



١ أجد ناتج ضرب المصفوفات فيما يأتي (إن أمكن):

$$\begin{bmatrix} ٣ & ٤ \\ ١- & ٥ \\ ٧ & ٢ \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} ١ & ٥ & ٣ \\ ٢ & ٤- & ٥ \end{bmatrix} \text{ (ب) } \begin{bmatrix} ٠ & ٣ & ١ \\ ٢- & ٤ & ٥- \\ ١ & ٥ & ١ \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} ٣ & ٤ & ٧ \end{bmatrix} \text{ (أ)}$$

٢ كانت مبيعات محل تجاريّ من أربعة أنواع من أجهزة الحاسوب A، ب، ج، د في أول شهرين من عام ٢٠١٨ ممثلة في المصفوفة س = $\begin{bmatrix} ١٢ & ١٥ & ١٧ & ١٠ \\ ١٦ & ٢٠ & ١٠ & ٢٠ \end{bmatrix}$ ، وكان ثمن الأجهزة ٤٥٠ دينار، ٣٠٠ دينار، ٥٠٠ دينار، ٤٠٠ دينار، على الترتيب. استخدم المصفوفات لإيجاد المصفوفة التي تمثل مبيعات المحل من الأجهزة في الشهرين.

$$\begin{bmatrix} ٥ & ٧- \\ ٢ & ٤ \\ ١- & ٣ \end{bmatrix} = \text{A إذا كانت P} ، \begin{bmatrix} ٢ \\ ٦ \end{bmatrix} = \text{B} ، \text{ أجد ما يلي:}$$

(أ) ٥ (P . B) (ب) (P . B) (ج) P . (B) (د) P . (B)

$$\begin{bmatrix} ٤ \\ \text{B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٣ \\ ١ \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} ١ & \text{A} \\ ٣ & ٢ \end{bmatrix} \text{ إذا كانت ما قيمة كل من الثابتين A، B؟}$$

النظير الضربي للمصفوفة المربعة من الرتبة الثانية

أولاً: المحددات: (Determinants)

نشاط (١)

يصنّف الخبراء الاقتصاد الفلسطيني، بأنه في وضع المخاطرة. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والتي تعيق نمو هذا الاقتصاد. لذا فإن المشاريع الصغيرة ذات رأس المال المحدود، والربح البسيط، تقلل من مخاطرة المستثمر.

يُتاجر أبو عارف بالأعلاف. اشترى خلال شهر أيلول ٢٠٠ كيساً من الأعلاف بسعر ١٠ دنانير للكيس الواحد، وباع منها ١٩٢ كيساً بسعر ١٣ ديناراً للكيس الواحد.

تنظم المصفوفة $P = \begin{bmatrix} 10 & 200 \\ 13 & 192 \end{bmatrix}$ بيانات تجارة أبو عارف خلال شهر أيلول.

- مجمل سعر البيع المتوقع لو أن أبو عارف باع جميع الأكياس $= 13 \times 200 = 2600$ دينار.
- مجمل سعر التكلفة لما تم بيعه فعلاً من أكياس العلف = _____.
- الفرق بين سعر البيع المتوقع وسعر التكلفة لما تم بيعه = _____.

تعريف

إذا كانت P مصفوفة مربعة من الرتبة الثانية، فإن محدد المصفوفة $P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix}$ هو عدد حقيقي ويرمز له بالرمز $|P|$ حيث $|P| = (p_{11} \times p_{22}) - (p_{12} \times p_{21})$.

مثال (١)

أجد محدد كل من المصفوفات الآتية: (١) $P = \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 3- & 1 \end{bmatrix}$ (٢) $B = \begin{bmatrix} 12 & 8 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$

الحل:

$$(1) \quad (P_{11} \times P_{11}) - (P_{12} \times P_{21}) = |P|$$

$$(9 \times 1) - (3 \times 3) = |P|$$

$$9 - 9 =$$

$$(2) \quad \begin{vmatrix} 12 & 8 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = |B|$$

$$(B_{11} \times B_{11}) - (B_{12} \times B_{21}) = |B|$$

$$(2 \times 12) - (3 \times 8) =$$

$$24 - 24 =$$

$$= \text{صفر}$$

تعريف

تُسمى المصفوفة التي محددتها يساوي صفر بالمصفوفة المنفردة.

مثال (٢)

إذا كانت $P = \begin{bmatrix} 3 & 1-s \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ ، أجد قيمة s التي تجعل P مصفوفة منفردة.

الحل:

بما أن P مصفوفة منفردة فإن محدد $|P| = 0$.

ومنها $(1-s) \times 2 - 3 \times 2 = \text{صفر}$ ومنها: $s-2 = -6$ صفر

$s-2 = -8$ صفر

إذن $s = 4$.

مثال (٣)



إذا كانت $P = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ ، أجد كل مما يأتي :

$$|P|^2 (3) \quad (3)$$

$$|P| \quad (2)$$

$$|P| \quad (1)$$

الحل:

$$(1) \quad |P| = (2 \times 1) - (1 \times 3) = 1 - 3 = -2$$

$$|P|^2 = (-2)^2 = 4$$

$$(2) \quad |P| = \begin{vmatrix} 9 & 3 \\ 6 & 3 \end{vmatrix} = 27 - 18 = 9$$

$$|P|^3 = 9 \times 9 = 81$$

$$(3) \quad |P|^2 (3) = 81 \times 3 = 243$$

ماذا تلاحظ؟

أتعلم



إذا كانت P مصفوفة مربعة من الرتبة الثانية، K عدد حقيقي، فإن $|K P| = K^2 |P|$

نشاط (٢)



إذا كانت P مصفوفة مربعة من الرتبة الثانية وكانت $|P| = 5$ ، فإن:

$$|P| = 5 \Rightarrow |P|^2 = 25$$

$$|P| = 5 \Rightarrow |P|^3 = 125$$

ثانياً: النظير الضربي للمصفوفة المربعة من الرتبة الثانية

تعريف



إذا كانت P مصفوفة غير منفردة من الرتبة الثانية، فإن المصفوفة B من الرتبة الثانية تسمى نظيراً ضربياً للمصفوفة P إذا كان $P \cdot B = B \cdot P = I$ ، حيث I هي المصفوفة المحايدة.

ويرمز للنظير الضربي للمصفوفة P بالرمز P^{-1} ، أي أن $P \cdot P^{-1} = P^{-1} \cdot P = I$.

مثال (٤)

إذا كانت $P = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} 3,5 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$ ، أيبين أن المصفوفة B هي النظير الضربي للمصفوفة P .

الحل:

إذا كانت المصفوفة B هي النظير الضربي للمصفوفة P ، فإن $P \cdot B = B \cdot P = M$.

$$P \cdot B = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3,5 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (\text{لماذا؟})$$

$$B \cdot P = \begin{bmatrix} 3,5 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (\text{لماذا؟})$$

إذن B هي النظير الضربي للمصفوفة P .

■ أفكر: هل يوجد نظير ضربي للمصفوفة $S = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$ ، لماذا؟

أتعلم

المصفوفة المنفردة ليس لها نظير ضربي.

مثال (٥)

أحدد أي من المصفوفات الآتية لها نظير ضربي وأيها لا؟

$$(1) P = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \quad (2) B = \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

الحل:

$$(1) \quad |P| = \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 7 - 12 = -5 \neq 0 \quad \text{إذن المصفوفة } P \text{ ليست منفردة، ويوجد لها نظير ضربي.}$$

$$(2) \quad |B| = \begin{vmatrix} 4 & 8 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 16 - 16 = 0 \quad \text{ومنها } B \text{ مصفوفة منفردة وليس لها نظير ضربي.}$$

تعريف



$$\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} \frac{1}{|P|} = {}^1P \text{، حيث } |P| \neq \text{صفر، فإن: } {}^1P = \frac{1}{|P|}$$

مثال (٦)



$$\text{أجد النظير الضربي للمصفوفة } P = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \text{ (إن أمكن).}$$

الحل:

$$(p_{11} \times p_{22}) - (p_{12} \times p_{21}) = |P|$$

$$|P| = (2 \times 1) - (4 \times 1) = 2 - 4 = -2 \text{، اذا يوجد للمصفوفة } P \text{ نظير ضربي}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0,5 & 0,5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{-2} = {}^1P$$

نشاط (٣)



$$\text{اذا كانت } P = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \text{، فإن: } |P| = (5 \times 1) - (3 \times 2) = 5 - 6 = -1$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{-1} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} \frac{1}{|P|} = {}^1P \text{ ومنها:}$$

$$|{}^1P| = \frac{1}{|P|} = \frac{1}{-1} = -1 \text{، ماذا تلاحظ؟}$$

أتعلم



$$P = {}^1({}^1P)$$

تمارين ومسائل (٢ - ٤)



١ أجد قيمة س التي تحقق $\begin{vmatrix} 5 & 12 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 6$

٢ إذا كان $|4ب| = 32$ ، أجد: قيمة $|ب| + |3ب|$ ، حيث ب مصفوفة مربعة من الرتبة الثانية.

٣ أجد النظير الضربي لكل من المصفوفات الآتية (إن أمكن):

$$\begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = ج، \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = ب، \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = د$$

٤ أكتب كلاً من الأنظمة الخطية الآتية على صورة معادلات مصفوفية:

$$\begin{aligned} (أ) \quad 5س - 2ص &= 2 \\ 3س + 4ص &= 5 \end{aligned} \quad (ب) \quad \begin{aligned} 2س + 3ص &= 12 \\ 5س - 2ص &= 7 \end{aligned}$$

٥ أحلّ كلاً من المعادلات المصفوفية الآتية:

$$\begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \cdot (ب) \quad \begin{bmatrix} 26 & 13 \\ 13 & 39 \end{bmatrix} = س \cdot \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \quad (أ)$$

٦ أستخدم طريقة النظير الضربي لحل أنظمة المعادلات الآتية:

$$(أ) \quad \begin{aligned} 2س - 3ص &= 7 \\ 2س + 3ص &= 1 \end{aligned}$$

$$(ب) \quad \begin{aligned} 2س - 3ص &= 13 \\ 2س + 3ص &= 6 \end{aligned}$$

$$ص + 6 = س$$

حل نظام من معادلتين خطيتين باستخدام قاعدة كريمر

نشاط (١)

تعدّ المشاريع الصغيرة من الأفكار الاستثمارية قليلة المخاطرة، التي تساعد كل من المنتج والمستهلك، ومن الأمثلة عليها مشروع توزيع المواد التموينية الذي لا يحتاج المستثمر فيه لرأس مال كبير. يقوم مهندس بتوزيع المواد التموينية على المحلات التجارية، فإذا أعطى للبقالة الأولى ٨ صناديق من المعلبات، وصندوقين من العصير وكان ثمنها معاً ٤٠ ديناراً، بينما أعطى البقالة الثانية ٥ صناديق معلبات، و٣ صناديق من العصير مقابل ٣٢ ديناراً، فهل يمكن معرفة ثمن الصندوق الواحد من المعلبات والعصير؟

قاعدة كريمر:

تستخدم قاعدة كريمر لحلّ نظام من معادلتين خطيتين بمتغيرين، والذي يمكن كتابته بالصورة المصفوفية كالآتي: $E \cdot P = J$ ، حيث:

P : مصفوفة المعاملات، E : مصفوفة المتغيرات، J : مصفوفة الثوابت، $|P| \neq 0$ صفر فيكون:

$$S = \frac{|J_P|}{|P|} \quad \text{و} \quad V = \frac{|J_V|}{|P|} \quad \text{حيث:}$$

P : المصفوفة P بعد استبدال مدخلات عمود معاملات S فيها بمدخلات مصفوفة الثوابت.

V : المصفوفة P بعد استبدال مدخلات عمود معاملات V فيها بمدخلات مصفوفة الثوابت.

مثال (١)

استخدم قاعدة كريمر لحل نظام المعادلات الآتي:

$$S - V = 4$$

$$5S + 2V = 6$$

الحل:

أكتبُ نظام المعادلات الخطية على شكل معادلة مصفويّة:

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} س \\ ص \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} ١- & ١ \\ ٢ & ٥ \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} ١- & ١ \\ ٢ & ٥ \end{bmatrix} = \text{أفرض } P$$

$$\gamma = (١- \times ٥) - (٢ \times ١) = \begin{vmatrix} ١- & ١ \\ ٢ & ٥ \end{vmatrix} = |P|$$

$$\begin{bmatrix} ١- & ٤ \\ ٢ & ٦ \end{bmatrix} = \text{المصفوفة } P_s$$

$$\gamma = (١- \times ٦) - (٢ \times ٤) = \begin{vmatrix} ١- & ٤ \\ ٢ & ٦ \end{vmatrix} = |P_s| \text{ ومنها:}$$

$$\begin{bmatrix} ٤ & ١ \\ ٦ & ٥ \end{bmatrix} = \text{المصفوفة } P_v$$

$$\gamma = (٥ \times ٤) - (٦ \times ١) = \begin{vmatrix} ٤ & ١ \\ ٦ & ٥ \end{vmatrix} = |P_v| \text{ ومنها:}$$

$$س = \frac{|P_s|}{\gamma} = \frac{١٤}{٧} = ٢, \quad ص = \frac{|P_v|}{\gamma} = \frac{١٤-}{٧} = ٢-$$

إذن الحل : (س، ص) = (٢، ٢-)

مثال (٢)



استخدم قاعدة كرامر لحل نظام المعادلات الآتي: س - ٥ = ٢ص - ٤س

$$ص + س - ٤ = ٥ + ٣س$$

الحل: أولاً: أرتب المعادلات في النظام على صورة: أس + ب ص = جـ

فيكون النظام:

$$٥ = ٢ص - س$$

$$٩ = ٢س + ص$$

ثانياً: أكتبُ نظام المعادلات على شكل معادلة مصفويّة كالآتي:

$$\begin{bmatrix} ٥ \\ ٩ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{س} \\ \text{ص} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ٢- & ٥ \\ ١ & ٢- \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} ٢- & ٥ \\ ١ & ٢- \end{bmatrix} = \text{أفرض } P$$

$$١ = (٢- \times ٢-) - (١ \times ٥) = \begin{vmatrix} ٢- & ٥ \\ ١ & ٢- \end{vmatrix} = |P|$$

$$٢٣ = (٢- \times ٩) - (١ \times ٥) = \begin{vmatrix} ٢- & ٥ \\ ١ & ٩ \end{vmatrix} = |P_s|$$

$$٥٥ = (٢- \times ٥) - (٩ \times ٥) = \begin{vmatrix} ٥ & ٥ \\ ٩ & ٢- \end{vmatrix} = |P_v|$$

$$\text{ومنها: } \text{س} = \frac{٢٣}{١} = \frac{|P_s|}{|P|}, \text{ كما أن: } \text{ص} = \frac{٥٥}{١} = \frac{|P_v|}{|P|}$$

إذن الحل: (س، ص) = (٢٣، ٥٥).

نشاط (٢)

استخدام قاعدة كرامير لحل المعادلة المصفوفية الآتية:

$$\begin{bmatrix} ٤ \\ ٣ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{س} \\ \text{ص} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} ٢ & ٣ \\ ١- & ١ \end{bmatrix}$$

الحل:

$$\text{أفرض } P = \begin{bmatrix} ٢ & ٣ \\ ١- & ١ \end{bmatrix} \quad |P| = ٢ - ٣ = -١$$

$$\text{س} = \frac{|P_s|}{|P|} = \frac{\begin{vmatrix} ٢ & ٤ \\ ١- & ٣ \end{vmatrix}}{-١} = \frac{٢ - ٤}{-١} = ٢ \quad \text{لماذا؟}$$

$$\text{ص} = \frac{|P_v|}{|P|} = \frac{\begin{vmatrix} ٤ & ٣ \\ ٣ & ١ \end{vmatrix}}{-١} = \frac{٤ - ٣}{-١} = -١ \quad \text{لماذا؟}$$

إذن الحل: (س، ص) = (٢، -١)

تمارين ومسائل (٢ - ٥)



١ إذا كانت P مصفوفة من الرتبة الثانية

$$\text{وكان } \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = |P| = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 9 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 9 & 1 \end{vmatrix} = |P_{\text{ص}}|$$

أجد قيمة كل من S ، V .

٢ استخدم قاعدة كرامر في حل أنظمة المعادلات الآتية:

$$\text{أ) } \begin{cases} 3S - 4V = 8 \\ S + V = 12 \end{cases}$$

$$S + V = 12$$

$$\text{ب) } \begin{cases} 3S - 2V = 19 \\ S + V = 13 \end{cases}$$

$$S + V = 13$$

تمارين عامة

السؤال الأول: اختر رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يلي:

(١) إذا كانت $\begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ ، فما قيمة $\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ ؟

(أ) ٥ (ب) ٢ (ج) ١ (د) ١-

(٢) إذا كانت $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ، فما قيمة $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ، ص على الترتيب؟

(أ) (٢، ١) (ب) (١، ٢) (ج) (٢، ٥) (د) (١، ١-)

(٣) إذا كانت $\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ، فأَي من المصفوفات الآتية تمثل $\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ؟

(أ) $\begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$ (ب) $\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ (ج) $\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$ (د) $\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

(٤) إذا كانت S مصفوفة مربعة من الرتبة الثانية، وكان $|S| = 8$ ، فما قيمة $|3S|$ ؟

(أ) ١٨ (ب) ٦ (ج) ٤ (د) ٢

(٥) أي من المصفوفات الآتية ليس لها نظير ضربي؟

(أ) $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$ (ب) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ (ج) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ (د) $\begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$

(٦) إذا كانت $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ ، فما قيمة $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ ؟

(أ) ٢ (ب) ١ (ج) ١- (د) ٢-

(٧) عند حل نظام من معادلتين خطيتين، وُجِدَ أن $V = 2$ ، $|A| = 3$ ، $|A| = 6$ ، فما قيمة S ؟

(أ) ٣ (ب) ١ (ج) ١- (د) ٣-

(٨) إذا كان $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ ، فما قيمة $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ ؟

(أ) ٤ (ب) ٢ (ج) ١ (د) صفر

٩) إذا كانت P ، B ، J مصفوفات حيث $P \cdot B = J$ وكانت P 1×3 ، J 4×3 فما رتبة المصفوفة B ؟

- أ) 4×1 ب) 3×1 ج) 1×1 د) 3×4

١٠) ما قيمة s السالبة التي تجعل المصفوفة $\begin{bmatrix} 8 & s \\ s & 2 \end{bmatrix}$ منفردة ؟

- أ) $2-$ ب) $4-$ ج) $8-$ د) $16-$

السؤال الثاني: إذا كانت $P \cdot B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$ ، $P \cdot J = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ ، أجد ناتج $P \cdot (B+J)$.

السؤال الثالث: أستخدم قاعدة كرامر لحل نظام المعادلات الآتي:

$$2s + 1 = \text{ص} \quad , \quad s - 2 = \text{ص} = 4$$

السؤال الرابع: أجد قيمة/ قيم s التي تحقق المعادلة الآتية: $3 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + s \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ s & 6 \end{vmatrix} = 0$ ؟

السؤال الخامس: أجد المصفوفة s التي تحقق المعادلة المصفوفية الآتية:


$$s \begin{bmatrix} 8 & 14 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad ?$$

السؤال السادس: أقيم ذاتي: أكمل الجدول الآتي:

مؤشر الاداء			مستوى الانجاز	
			مرتفع	متوسط
			دون المتوسط	
تمييز أنواع المصفوفات ومسمياتها الاساسية				
ايجاد محدد المصفوفة				
توظيف خواص المحددات في حل مشكلات حياتية				
حل معادلات مصفوفية بعدة طرق				

المعادلات والمتسلسلات

Equations and Series



في لوحة الشطرنج أعلاه، إذا وُضع في المربع الأول حبتا قمح، وفي الثاني ٤ حبات، وفي الثالث ٨ حبات... وهكذا، كيف يمكن معرفة رقم المربع الذي توضع فيه ١٠٢٤ من حبات القمح؟

يتوقع من الطلبة بعد الإنتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على
توظيف المعادلات والمتسلسلات في الحياة العمليّة من خلال الآتي:

١. حلّ معادلات أسية.
٢. حلّ معادلات لوغاريتماتية.
٣. التّعرف إلى مفهوم المتسلسلة.
٤. التّعرف إلى المتسلسلة الحسابية وإيجاد مجموعها.

المعادلات الأسية:

نشاط (١)



فاقت سرعة انتشار الشبكة العنكبوتية كوسيلة إعلامية وسائل الإعلام الأخرى جميعها، حيث استغرق الراديو أكثر من ٣٢ سنة ليصل لـ ٥٠ مليون مستمع حول العالم، فيما استغرق التلفاز ١٦ سنة ليصل إلى العدد نفسه من المشاهدين. أما الشبكة العنكبوتية فلم تستغرق سوى ٤ سنوات لتصل للعدد ذاته من المستخدمين

استغرقت الشبكة العنكبوتية لتنتشر ٤ أعوام $(2)^4 = 16$ سنة.

واستغرق التلفاز لينتشر ١٦ عاماً $(2)^4 = 16$ سنة.

استغرق الراديو لينتشر ٣٢ عاماً $(2)^5 = 32$ سنة.

مثال (١)



أجد مجموعة حل المعادلة $(4)^x = 64$.
الحل:

$$(4)^x = 64$$

$$(4)^x = (4)^3 \quad \text{ومنها:} \quad x = 3 \quad (\text{لماذا؟})$$

مجموعة الحل هي $\{3\}$

أتذكر:

لكن $a, m, n \in \mathbb{R}, a \neq 1, a \neq 0$ صفر فإن:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad (٣)$$

$$a^0 = 1 \quad (٤)$$

$$a^m \cdot a^n = a^m \times a^n \quad (١)$$

$$a^{-m} = \frac{1}{a^m} \quad (٢)$$

مثال (٢)



أحل المعادلة ${}^{10}S^{-1}(9) = {}^{10}S^2(27)$

الحل:

$${}^2(3) = 9 \text{ كذلك } {}^2(3) = (27)$$

$$\text{ومنها: } {}^{3-2}S(3) = {}^{3-6}S(27) \text{ (لماذا؟)}$$

بما أن الأساسات متشابهة فتكون الأسس متساوية:

$$\text{أي أن: } 3 - 6 = 3 - 2$$

$$3 = 8$$

$$\text{ومنها مجموعة الحل: } \left\{ \frac{3}{8} \right\}$$

نشاط (٢)



$$\text{لإيجاد مجموعة حل المعادلة } {}^{10}S^{-1}\left(\frac{1}{16}\right) = {}^{10}S^2(8)$$

$$\text{أبدأ من الطرف الأيمن: } {}^2(2) = 8$$

$$\text{ومنها } {}^{3-2}S({}^2(2)) = {}^{3-2}S(8)$$

$$= \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{في الطرف الأيسر: } {}^{10}S^{-1}\left(\frac{1}{16}\right) = \dots\dots\dots \text{ (لماذا؟)}$$

$$= {}^{10}S^{-1}\left(\frac{1}{16}\right)$$

$$= {}^{10}S^{-1}\left(\frac{1}{16}\right) = {}^{10}S^{-1}\left(\frac{1}{16}\right) \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{المعادلة } {}^{10}S^{-1}\left(\frac{1}{16}\right) = {}^{10}S^2(8) \text{ تكافئ } {}^{9-8}S^{-1}(2) = {}^{9-6}S^2(2)$$

بما أن الأساسات متشابهة، إذن الأسس متساوية،

$$\text{أي أن: } 9 - 8 = 9 - 6$$

ومنها تكون مجموعة الحل:

تمارين ومسائل (٣ - ١)



أجد مجموعة حلّ كل من المعادلات الأسية الآتية:

أ) $(٨)^{٣-٥س} = (٤)^{٣-٦س}$

ب) $(٧)^{٢-س} = (٤٩)^{٤-٥س}$

ج) $(٢٧)^{٢-س} = (٨١)^{٢-٣س}$

ما مجموعة حلّ كل من المعادلات الأسية الآتية؟

أ) $(\frac{1}{9})^{٣-س} = ٢٧$

ب) $(١٢٥)^{٢-س} = (٥)^{٢-٩س}$

ج) $(٦)^{٢-س} = ٢١٦$

المعادلات اللوغاريتمية

نشاط (١)



بدأ العمل في فلسطين حديثاً على إقامة أبنية مقاومة للزلازل، ويستخدم مقياس ريختر لقياس شدة الزلازل، وكل زيادة بمقدار درجة واحدة على هذا المقياس تمثل ١٠ أضعاف سابقتها في سعة الزلزال. لذا فإن زلزالاً بقوة ٥,٣ قوياً، في حين يعتبر زلزال آخر بقوة ٦,٣ مدمراً.

وتعتمد تقنية هذا الجهاز بشكل أساسي على اللوغاريتمات، حيث تعني الدرجة الواحدة ١٠ أضعاف الدرجة السابقة لها.

- درجة واحدة على مقياس ريختر = 10^1 = _____.

- درجتين على مقياس ريختر = 10^2 = _____.

- ٣ درجات على مقياس ريختر = _____.

نشاط (٢)



$10^3 = 1000$ لأن $10^2 = 100$ كما أن:

$10^4 = 10000$ لأن _____.

أحول $10^8 = 100000000$ إلى الصورة اللوغاريتمية: _____.

$10^8 \times 10^8 = 10^{16}$ $10^8 + 10^8 = 10^{16}$

كما أن $10^{\frac{27}{9}} = \frac{10^{27}}{10^3}$

أَتَذَكَّرُ:

إذا كانت p ، s ، v < صفر، $p \neq 1$ فإن:

$$(1) \text{ لوم } 1 = \text{ صفر} \quad (2) \text{ لوم } p = 1$$

$$(3) \text{ لوم } s = \text{ جـ تكافئ } p = s \quad (4) \text{ لوم } (s \times v) = \text{ لوم } s + \text{ لوم } v$$

$$(5) \text{ لوم } \left(\frac{s}{v}\right) = \text{ لوم } (s) - \text{ لوم } (v) \quad (6) \text{ لوم } s^n = n \times \text{ لوم } s, s < 0$$

مثال (١)

أحلّ المعادلة $\text{لوم } s = 3$.

الحلّ:

لحلّ المعادلة اللوغاريتمية نحولها أولاً للصورة الأسية.

$$\text{لوم } s = 3 \text{ تكافئ } (2)^3 = s$$

$$\text{ومنها: } s = 8$$

مثال (٢)

أحلّ المعادلة اللوغاريتمية الآتية: $\text{لوم } (s^2 - 5s + 6) = 3$

الحلّ:

لحلّ المعادلة اللوغاريتمية نحولها أولاً للصورة الأسية.

$$\text{لوم } (s^2 - 5s + 6) = 3 \text{ تكافئ: } s^2 - 5s + 6 = 2^3 = 8$$

$$s^2 - 5s + 6 = 8 \quad \text{ومنها: } (s - 3)(s - 1) = 0$$

مجموعة الحلّ: $\{1, 3\}$

مثال (٣)

أجدّ مجموعة حلّ المعادلة $\text{لوم } 4 = 3 - 2s$

الحلّ: لحلّ المعادلة اللوغاريتمية نحولها أولاً للصورة الأسية.

$$(4)^{2-3s} = 3 \quad \text{وبما أن الأساسات متشابهة فإن الأسس متساوية،}$$

$$3 = 3 - 2s$$

$$s = 0 \quad (\text{لماذا؟})$$

$$\text{مجموعة الحلّ: } \{0\}$$

تمارين ومسائل (٣ - ٢)



١ أجدُ مجموعة حلّ كل من المعادلات الآتية:

أ) $ل_٥(٤ - ٤) = ٤$

ب) $ل_٥(٣٤٣) = ٢ - ١$

ج) $ل_٥(٦ - ٣) = ٣$

د) $ل_٥(٣ + ٣ - ٣) = ٠$

هـ) $ل_٥(١٠) = ٢ + ٤$

٢ أجدُ مجموعة حلّ المعادلة $ل_٥(٣ - ٣) = ٠$

٣ أحل المعادلة اللوغاريتمية الآتية: $ل_٥(١ - ١) - ل_٥(٥ - ٥) = ١$

المتسلسلات



نشاط (۱)

بدأت رياضة كرة السلة بالانتشار في أرجاء فلسطين في ثلاثينات القرن الماضي. وتقسم المباراة إلى ٤ فترات، مدة كل منها ١٠ دقائق، وتحسب النقاط للأهداف كالاتي:

نقطة واحدة: هدف من رمية حرة.

نقطتان: هدف مباشر من داخل منطقة الجراء.

ثلاث نقاط: هدف من خارج منطقة الجراء.

أحرز منتخب فلسطين لكرة السلة في إحدى مبارياته الخارجية عشرة أهداف في الربع الأول، الجدول الآتي يمثل النقاط التي تم احتسابها عن تلك الأهداف:

١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	الهدف
٢	١	١	٢	٢	٢	١	٣	٢	٢	عدد النقاط

متتالية النقاط المحتسبة (ف) = ٢، ٢ ، ٣ ، ١ ، ٢ ، ____ ، ____ ، ____ ، ____ ، ____ .

أما مجموع نقاط المنتخب ٢+٢ +__+__+__+__+__+__+__+__

فتسمي متسلسلة النقاط.

تعريف

المتسلسلة $(\sum_{i=1}^n \text{ح}_i)$ تمثل مجموع حدود المتتالية (ح_i) المقابلة لها، ويكون حدها العام $(\sum_{i=1}^{\infty} \text{ح}_i)$ ،

ويعبر ج_١ عن مجموع حدودها.

مثال (١)



أكتب المتسلسلة المقابلة للمتتالية $F = \{3, -1, 4, 9, -5\}$ ، ثم أجد مجموعها
الحل:

$$\sum_{r=1}^5 F_r = 3 - 1 + 4 + 9 - 5.$$

$$\text{لاحظ أن: } \sum_{r=1}^5 F_r = J.$$

(لماذا؟)

ومنها: $J = 10$

مثال (٢)



إذا كان $H_n = 1 + 2^n$ ، أكتب المتسلسلة المقابلة لها، ثم أجد مجموع أول ٤ حدود منها (ج).

الحل:

$$\text{المتسلسلة هي } \sum_{r=1}^n H_r = \sum_{r=1}^n (1 + 2^r)$$

$$2 + 5 + 10 + 17 = \sum_{r=1}^4 (1 + 2^r)$$

ومنها: $J = 34$

نشاط (٢)



المتتالية ٣، ٤، ٥، ٦، ...، ١٣ متتالية منتهية وهذا يعني أن المتسلسلة ٣ + ٤ + ٥ + ٦ + ... + ١٣ منتهية
أيضاً، لكن المتتالية ٤٨، ٢٤، ١٢، ٦، ... غير منتهية، لذا فإن المتسلسلة ٤٨ + ٢٤ + ١٢ + ٦ + ... هي
متسلسلة _____.

مثال (٣)



أوجد مجموع أول ٣ حدود في المتسلسلة $\sum_{r=1}^{\infty} (7 - 2r)$

الحل: $ح_1 = 7 - (1)2 = 5-$

$ح_2 = 7 - (2)2 = 3-$

$ح_3 = 7 - (3)2 = 1-$

إذن $ج_3 = 5- + 3- + 1- = 9-$

مثال (٤)



أوجد مجموع أول ٣ حدود من المتسلسلة: $\sum_{r=1}^{\infty} \left(\frac{r}{1+r^2} \right)$

الحل:

$$\frac{3}{7} + \frac{2}{5} + \frac{1}{3} = \left(\frac{r}{1+r^2} \right) \sum_{r=1}^3 = ج_3$$

$$\frac{45}{105} + \frac{42}{105} + \frac{35}{105} =$$

$$\frac{122}{105} = ج_3$$

تمارين ومسائل (٣ - ٣)



١ أكتب الحدود الأربعة الأولى من مفكوك كل من المتسلسلات الآتية:

أ) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{n^2}{n+2} \right)$

ب) $\sum_{n=0}^{\infty} n^2$

٢ أكتب المتسلسلات الآتية منتهية وأنها غير منتهية:

أ) $2 + 8 + 18 + 32 + \dots$

ب) $1 + 8 + 27 + 64 + 125$

ج) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{n^2 + 1}{n+2} \right)$

٣ أجد مجموع (ج) كل من المتسلسلات الآتية:

أ) $\sum_{n=0}^7 (2n^2 - 3n - 4)$

ب) $\sum_{n=0}^8 (8)$

ج) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n+2}$

٤ إذا كان مجموع الحدود الأربعة الأولى من المتسلسلة $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 + 2}{n+2}$ يساوي $\frac{97}{5}$ ، فما قيمة الثابت ؟

المتسلسلة الحسابية ومجموعها



نشاط (١)



تعتبر زراعة الفراولة من الاستثمارات المجدية من الناحية المادية للمزارع الفلسطيني. ويراعى عند نقلها، توزيعها، في عبوات تتسع لكميات قليلة نسبياً، حفاظاً على جودتها.

إذا وُزّع إنتاج مزرعة فراولة في غزة في يوم ما على عبوات تتسع كل منها لـ ٣ كغم، فإن كتلة الفراولة في العبوتين الأولى والثانية معاً $= ٣ + ٣$ كغم

كتلة الفراولة في أول ٣ عبوات = _____ كغم.

كتلة الفراولة في أول ٤ عبوات = _____ كغم.

متسلسلة كتلة الفراولة المنتجة في المزرعة والموزعة في (ن) عبوة هي: $٣ + ٣ + \dots + ٣$ كغم.

أَتَذَكَّرُ:

المتتالية الحسابية: هي المتتالية التي يكون الفرق بين أي حدين متتاليين فيها يساوي مقداراً ثابتاً دائماً.

وحدها العام $ح = ١ + (ن - ١) د$ ، حيث ١ : الحد الأول، $د$: الأساس، $ن$: رتبة الحد النوني.

أَتَعَلَّمُ



تعرف المتسلسلة الحسابية بأنها مجموع حدود المتتالية الحسابية المرتبطة بها.

مثال (١)



أُمَيِّر المتسلسلة الحسابية من غيرها فيما يأتي:

$$(١) ٧ + ١٠ + ١٣ + ١٦ + ١٩$$

$$(٢) ٢ + ٣ + ٥ + ٦ + ٨$$

الحل:

(١) المتسلسلة حسابية ، لأن:

$$٣ = ١٠ - ١٣ = ٧ - ١٠$$

$$٣ = ١٠ - ١٣ = ١٣ - ١٦$$

$$٣ = ١٣ - ١٦ = ١٦ - ١٩$$

(٢) المتسلسلة ليست حسابية ، لأن $٦ - ٨ = ٢ - ٥$ ، بينما $١٠ - ٦ = ٣$

$$٦ - ٨ \neq ١٠ - ٦$$

نشاط (٢)



بدأ فني كهربائيات عام ٢٠١٨ م العمل في إحدى المصانع الفلسطينية براتب سنوي قدره ٦٠٠٠ دينار، حيث

يتقاضى علاوة سنوية ثابتة قدرها ١٠٠ دينار.

المتسلسلة الحسابية التي تمثل ما سيتقاضاه الفني سنوياً من بداية عام ٢٠١٨ م حتى نهاية عام ٢٠٢٠ م هي: —

_____.

مجموع هذه الرواتب يساوي _____.

وأساسها: $d = ١٠٠$

الحد الأول في متسلسلة الرواتب: $٦٠٠٠ = a$

إذن مجموعها $= \sum$ _____.

أتعلم



مجموع أول n حداً من حدود متسلسلة حسابية حدها الأول p وأساسها d ، يعطي بالقانون:

$$ج_n = \frac{n}{2} (p + (n-1)d)$$

مثال (٢)



أجد مجموع أول ٤٠ حداً من المتسلسلة الحسابية $١٢ + ١٠ + ٨ + ٦ + \dots$

الحل:

$$p = ١٢, \quad d = -٢, \quad n = ٤٠$$

$$ج_n = \frac{n}{2} (p + (n-1)d)$$

$$ج_{٤٠} = \frac{٤٠}{2} (١٢ + (٤٠-1)(-٢))$$

$$= ٢٠ (١٢ - ٧٨)$$

$$= ٢٠ (-٦٦) = -١٣٢٠$$

مثال (٣)



أجد مجموع المتسلسلة $٤ + ٨ + ١٢ + ١٦ + ٢٠ + ٢٤$

الحل:

المتسلسلة حسابية (لماذا؟) وفيها: $p = ٤, \quad d = ٤, \quad n = ٦$

$$ج_n = \frac{n}{2} (p + (n-1)d)$$

$$ج_٦ = \frac{٦}{2} (٤ + (٦-1) \times ٤)$$

$$= ٣ (٤ + ٢٠) = ٨٤$$

ألاحظ أن:

$$ج_6 = \frac{6}{2} = \frac{4 \times (1-6) + 4 \times 2}{2}$$

$$= \frac{6}{2} = \frac{4 \times (1-6) + 4 + 4}{2}$$

لكن: $ج_6 = 4 \times (1-6) + 4$ وهو الحد الأخير.

$$إذن ج_6 = \frac{6}{2} = (ج_6 + 4)$$

$$3 = (24 + 4)$$

هل يمكن إيجاد الناتج بطريقة أخرى؟ $84 =$

نتيجة: يمكن إيجاد مجموع أول n حدود من متسلسلة حسابية حدها الأول l ، و حدها الأخير L بالقاعدة:

$$ج_n = \frac{n}{2} (l + L)$$

نشاط (3)



$$أجدُ \sum_{i=1}^{60} (12 - i)$$

الحل: ألاحظ أن المتسلسلة حسابية (لماذا؟)

$$ج_1 = 12 - 1 = 11$$

$$ج_{60} = 12 - 60 = -48$$

إذن المتسلسلة حسابية، فيها $l = 11$ ، $L = -48$ ، $n = 60$

$$ج_n = \frac{n}{2} (l + L)$$

$$ج_{60} = \frac{60}{2} (11 + (-48))$$

مثال (٤)



أجدُ الحد الخامس عشر في المتسلسلة الحسابية التي يعطى مجموعها بالعلاقة: $J_n - J_{n-2}$

الحل:

ألاحظ أن الحد الأول $J_1 = 3$.

$$J_2 = 4 - (1) = 3$$

$$J_3 = 4$$

مجموع أول حدين $J_2 + J_1 = 3 + 4 = 7$

$$J_4 = 8 - (2) = 6$$

$$J_5 = (J_4 - J_3) = 6 - 4 = 2$$

$$J_6 = 7 - 6 = 1$$

كما أن أساس المتسلسلة $J_6 - J_5 = 1$ (لماذا؟)

$$J_7 = 1 - 2 = -1$$

$$J_8 = -2$$


$$J_9 = 3 - (1 - 2) = 4$$

$$J_{10} = 3 - (1 - 3) = 5$$

$$J_{11} = 5 - 4 = 1$$

(هل هناك حلول أخرى؟).

تمارين ومسائل (٣ - ٤)



١ أكتب الحدود الأربعة الأولى من مفكوك كلٍّ من المتسلسلات الآتية:

$$(أ) \sum_{r=1}^7 (1 + 3r)$$

$$(ب) \sum_{r=1}^{17} (2r)$$

٢ متسلسلة حسابية حدها الأول ١٤، وأساسها يساوي ٥ أجد مجموع أول ٢٠ حداً منها.

٣ أجد الحد الأول في المتسلسلة الحسابية التي أساسها ٢ ومجموع أول ٦٠ حداً فيها يساوي ١٢٠

٤ كم حداً يجب أخذه من متسلسلة حسابية حدها الأول ٣ وأساسها ٦ ليكون مجموع تلك الحدود = ٢٧؟

٥ متسلسلة حسابية حدها الأول ٣ وحدها الستون = ٨٧، أجد ج. .

تمارين عامة

السؤال الأول: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة:

(١) متسلسلة حسابية حدها الأول ٣ وحدها العاشر ٢١، ما مجموع أول عشرة حدود منها؟

- (أ) ٢٠ (ب) ٤٠ (ج) ٥٠ (د) ١٢٠

(٢) متسلسلة حسابية مجموع أول ستة عشر حداً فيها ٣٢، وأساسها ٢-، ما حدها الأول؟

- (أ) ٣٤ (ب) ١٧ (ج) ١٦ (د) ١٣-

(٣) ما قيمة: $\log_{٢٤٣}(٨١ \times ٢٤٣)$ ؟

- (أ) ٥ (ب) ٢٠ (ج) ٩ (د) ٤

(٤) ما قيمة s التي تحقق المعادلة $64 = \left(\frac{1}{32}\right)^{s-1}$ ؟

- (أ) ٥- (ب) $\frac{1-}{٥}$ (ج) ٥ (د) $\frac{١١}{٥}$

(٥) ما مجموعة حل المعادلة: $\log_{٣٧}(٣) = ١-s٣$ ؟

- (أ) ٧ (ب) ٣ (ج) $\frac{١٦}{٣}$ (د) ٧-

السؤال الثاني: أكتب أول ٥ حدود لمتسلسلة حسابية مجموع حديها الثاني والتاسع = ٢٥، ومجموع

حديها الثالث والسابع = ٢٠.

السؤال الثالث: إذا كان مجموع أول n حداً من متسلسلة حسابية يعطى بالعلاقة $s_n = n(2n+1)$ أجد الحد الأول والأساس لتلك المتسلسلة.

السؤال الرابع: تعاقد مهندس مع إحدى الشركات براتب سنوي قدره ١١٥٠٠ دينار و بزيادة سنوية قدرها ٥٠ ديناراً.

- (أ) ما الراتب السنوي الذي تقاضاه هذا الموظف في نهاية السنة السادسة؟
(ب) ما مجموع ما تقاضاه خلال عشر سنوات؟

السؤال الخامس: ما مجموعة حل كل من المعادلتين الآتيتين؟

$$(أ) \quad 2(169)^{x^2} = 26 \quad (ب) \quad 4^x(9)^x = 27$$

السؤال السادس: ما مجموعة حل كل من المعادلتين اللوغاريتميتين الآتيتين؟

$$(أ) \quad \log_{(25)}^{x-2} = \log_{(64)}^x \quad (ب) \quad \frac{\log_{(0.0001)}^{x-1}}{\log_{(100000)}^{x-1}} = 1$$

السؤال السابع: ما مجموعة حل المعادلة: $\frac{1}{x} = \log_{(64)}^2 + \log_{(243)}^x + 2 \log_{(125)}^0$

السؤال الثامن: أقيم ذاتي: أكمل الجدول الآتي:

مؤشر الاداء			مستوى الانجاز		
			مرتفع	متوسط	دون المتوسط
حل معادلات أسية					
حل معادلات لوغاريتمية					
ايجاد مجموع متسلسلة حسابية					
ايجاد مجموع متسلسلة هندسية					



الوحدة



الإحصاء Statistics



لاحظ التماثل في جبل طابور... ماذا يعني لك هذا التماثل؟

يتوقع من الطلبة بعد الإنتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على
توظيف التوزيع الطبيعي المعياري في الحياة العمليّة من خلال الآتي:

١. التعرف إلى العلامة المعيارية.
٢. التعرف إلى التوزيع الطبيعي المعياري وخواصه.
٣. استخدام الجداول في إيجاد المساحة تحت منحنى التوزيع الطبيعي المعياري.
٤. توظيف خواص التوزيع الطبيعي المعياري في حل مشكلات حياتية.

العلامة المعيارية

نشاط (١)

كثيراً ما نضطر لإطلاق أحكام على أمور ظاهرية دون الأخذ بعين الاعتبار سياقها العام. ويتصف هذا النوع من الأحكام بعدم الموضوعية في أغلب الأحيان. الجدول الآتي يبين علامات خمس طالبات من الصف العاشر خلال شهرين في مبحث اللغة العربية.

الطالبة	سناء	يسرى	دعاء	هديل	سلمى
اختبار شهر أيلول	٩٢	٨٩	٨٧	٨٨	٩٠
اختبار شهر تشرين أول	٧٧	٨٠	٧٩	٧٦	٧٤

- ترتيب أسماء الطالبات تنازلياً حسب علامتهن خلال شهر أيلول:

سناء، سلمى، يسرى، هديل، دعاء.

- ترتيب أسماء الطالبات تنازلياً حسب علامتهن خلال شهر تشرين أول:

____، ____، ____، ____، ____.

- في أي الشهرين كان أداء دعاء أفضل؟ لماذا؟

تستخدم العلامة المعيارية في إطلاق أحكام على قيم عددية للظواهر مع الأخذ بعين الاعتبار الوسط الحسابي تلك القيم، وانحرافها المعياري.

تعريف

العلامة المعيارية: إذا كان الوسط الحسابي لمجموعة من البيانات يساوي (μ) وانحرافها المعياري (σ) ، فإن العلامة المعيارية (ع) المقابلة للقيمة (س) تمثل عدد الانحرافات المعيارية التي تنحرفها القيمة س عن الوسط الحسابي للبيانات. وبالرموز فإن:
$$\frac{\mu - س}{\sigma} = ع$$

مثال (١)



إذا كان الوسط الحسابي لعلامات (٣٠) طالبا في الصف الثاني عشر الأدبي في اختبار الجغرافيا يساوي (١٣) وانحرافها المعياري (٢). فإذا حصل ثلاثة طلاب على العلامات: ١١، ١٣، ٢٣، فما هي القيم المعيارية المناظرة لكل منهم؟

الحل:


$$ع = \frac{\mu - س}{\sigma}$$

$$العلامة المعيارية (ع) المقابلة للعلامة (س = ١١) هي ع = \frac{١٣ - ١١}{٢} \leftarrow ع = ١ -$$

$$العلامة المعيارية (ع) المقابلة للعلامة (س = ١٣) هي ع = \frac{١٣ - ١٣}{٢} \leftarrow ع = ٠ -$$

$$العلامة المعيارية (ع) المقابلة للعلامة (س = ٢٣) هي ع = \frac{١٣ - ٢٣}{٢} \leftarrow ع = ٥ -$$

أناقش



ماذا يعني أن تكون العلامة المعيارية لإحدى القيم تساوي صفراً؟

نشاط (٢)



الشعبة	μ	σ
أ	٧٩	٦
ب	٧٦	٢

حصل ناصر في الشعبة (أ) على علامة ٨٥ في اختبار الرياضيات، فيما حصل محمد في الشعبة (ب) على علامة ٨٠ في الاختبار نفسه. الجدول المجاور يبين الوسط الحسابي والانحراف المعياري لكلا الشعبتين، أي الطالبين كان تحصيله أفضل؟

$$الحل: ع = \frac{\mu - س}{\sigma}$$

$$ع ناصر = \frac{٧٩ - ٨٥}{٦} = ١ \text{ (لماذا؟)}$$

$$ع محمد = \frac{76 - 80}{2} = -2$$

إذن تحصيل أفضل من تحصيل

مثال (٢)



إذا كان الوسط الحسابي لأعمار مجموعة من الآباء يساوي (٤٣) سنة وانحرافها المعياري (٥) سنة وكانت العلامة المعيارية المقابلة للعمر (س) تساوي (٤) ما العمر س؟

الحل:

$$\frac{\mu - س}{\sigma} = ع$$

$$\frac{٤٣ - س}{٥} = ٤$$

$$٤٣ - س = ٢٠$$

$$س = ٦٣$$

نشاط (٣)



كانت أعمار مجموعة من الأشخاص كالتالي: ١٢، ١٦، ١٨، ٢٠، ٢٤.

(١) الوسط الحسابي لأعمار هؤلاء الأشخاص تساوي ١٨، و انحرافها المعياري ٤ =

(٢) - العلامة المعيارية (ع) المناظرة للعمر ١٢ تساوي - ١,٥

- العلامة المعيارية (ع) المناظرة للعمر ١٦ تساوي _____.


- العلامة المعيارية (ع) المناظرة للعمر ١٨ تساوي _____.

- العلامة المعيارية (ع) المناظرة للعمر ٢٠ تساوي _____.

- العلامة المعيارية (ع) المناظرة للعمر ٢٤ تساوي _____.

(٣) الوسط الحسابي لمجموعة العلامات المعيارية = $\frac{ع_١ + ع_٢ + ع_٣ + ع_٤ + ع_٥}{٥}$ = _____.

أتعلم*



الوسط الحسابي لجميع العلامات المعيارية لتوزيع ما يساوي صفر،
وانحرافها المعياري يساوي واحد.

مثال (٣)



أُخذت أطوال ٥ أشخاص، وكانت العلامات المعيارية المناظرة لتلك الأطوال كالاتي:

٠,٥، ل، ١,٥، ٠، -٠,٥ فما قيمة ل

الحل:

$$\text{الوسط الحسابي للعلامات المعيارية} = \frac{٠,٥ + ل + ١,٥ + ٠ + -٠,٥}{٥} = \text{صفر}$$

أي أن:

$$ل + ١,٥ = \text{صفر (لماذا؟)}$$

$$ل = -١,٥$$

* مجموع العلامات المعيارية لتوزيع ما يساوي صفر.

تمارين ومسائل (٤ - ١)



١ إذا كان $\mu = ٢٠$ ، $\sigma = ٤$ ، ما العلامة المعيارية (ع) التي تقابل العلامة س = ٢٨ .

٢ إذا كان مجموع علامات ٥٠ طالباً في امتحان التاريخ يساوي ١٠٠٠ ، وانحرافها المعياري $\frac{٥}{٢}$ ، ما العلامة المعيارية المناظرة للعلامة ١٥ ؟

٣ إذا كان الوسط الحسابي لأطوال ٢٠ طالباً يساوي ١٥٠ سم وانحرافها المعياري ٢ سم ، ما الطول الذي علامته المعيارية = ٣ ؟

٤ إذا كان الوسط الحسابي لكتلة مجموعة من الأشخاص يساوي ٥٠ كغم ، وانحرافها المعياري σ كغم ، وكانت العلامتان المعياريتان المقابلتان للكتلتين : س ، ٦٠ هما -٢ و ٤ على الترتيب :

أ) فما قيمة كل من س و σ ؟

ب) ما العلامة المعيارية المقابلة للكتلة ٥٨ كغم ؟

التوزيع الطبيعي المعياري



نشاط (١)



الهيموجلوبين هو بروتين موجود داخل كريات الدم الحمراء، وهو الذي يكسب خلايا الدم اللون الأحمر، وتتلخص وظيفته في نقل الأكسجين من الرئة إلى مختلف أعضاء الجسم حتى تقوم بوظائفها

على أكمل وجه. وتتراوح نسبة الهيموجلوبين في الدم عند الرجال البالغين في العالم بين ١٣ و ١٧ غرام/ديسيلتر. تتوزع نسبة الهيموجلوبين في الدم بشكل طبيعي بين الرجال البالغين. فقليلٌ منهم تنخفض لديهم هذه النسبة في الدم عن ١٣، كذلك نسبة قليلة جداً تزيد نسبة الهيموجلوبين عندهم عن ١٧.


- إذا كانت نسبة الهيموجلوبين في الدم لدى عُمر ١٠,٤، فمستوى الهيموجلوبين لديه منخفض.
- إذا كانت نسبة الهيموجلوبين في الدم لدى خالد ١٥,٣، فمستوى الهيموجلوبين لديه ____.
- إذا كانت نسبة الهيموجلوبين في الدم لدى علي ١٨,٢، فمستوى الهيموجلوبين لديه ____.

ظاهرة توزيع الهيموجلوبين في الدم ليست الوحيدة التي تتوزع طبيعياً، فالطول والوزن، وكمية الأمطار التي تهطل في منطقة ما جميعها لها ذات الميزة.

تعريف



منحنى التوزيع الطبيعي المعياري هو منحنى تكراري لتوزيع العلامات المعيارية مقابل تكراراتها، بوسط حسابي يساوي صفر، وانحراف معياري يساوي واحد.



وهذا الشكل يشبه شكل الجرس.

وأهم خصائصه:

١. متمائل حول $\bar{E}$.

٢. يُقسَّم المحور الأفقي فيه بمقدار انحراف معياري واحد بكل وحدة.

٣. المساحة المحصورة بين المنحنى والمحور الأفقي تساوي وحدة مربعة واحدة.

ومن الجدير بالإشارة أنَّ المساحة المحصورة بين قيمتين معياريتين يمكن حسابها من خلال جداول منظمة ودقيقة أعدت لهذا الغرض. لاحظ الملحق (١).

نشاط (٢)



أستخدم الجداول في حساب المساحة المحصورة بمنحنى التوزيع الطبيعي المعياري والواقعة تحت ($E=1,16$)

ع	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٢	٠,٠٣	٠,٠٤	٠,٠٥	٠,٠٦	٠,٠٧	٠,٠٨	٠,٠٩
٠,٠										
٠,١										
٠,٢										
٠,٣										
٠,٤										
٠,٥										
٠,٦										
٠,٧										
٠,٨										
٠,٩										
١,٠										
١,١										
١,٢										


أجد من الجدول أن : المساحة تحت ($E=1,16$) = $0,8770$

مثال (١)



أستخدم الجداول في حساب المساحة المحصورة بمنحنى التوزيع الطبيعي المعياري والواقعة:

١. تحت (ع = ١) ٢. تحت (ع = ١,٤٢) ٣. فوق (ع = ٢)



الحل: ١. المساحة تحت (ع = ١) تساوي ٠,٨٤١٣

٢. المساحة تحت ع = (١,٤٢) تساوي ٠,٩٢٢٢

٣. المساحة فوق (ع = ٢) = ١ - المساحة تحت (ع = ٢)


$$= ٠,٩٧٧٢ - ١$$

$$= ٠,٠٢٢٨$$

نشاط (٣)



أحسب نسبة المساحة المحصورة بين: (ع = ٠,٨-) و (ع = ١,٤)



الحل:

المساحة تحت (ع = ٠,٨-) = ٠,٢١١٩

المساحة تحت (ع = ١,٤) = ٠,٩١٩٢

إذن نسبة المساحة المحصورة بين (ع = ٠,٨-) و (ع = ١,٤) إلى

المساحة الكلية تساوي _____

أتعلم



نسبة المساحة المحصورة تحت منحنى التوزيع الطبيعي عندما (ع > ع_١) إلى المساحة الكلية تحت المنحنى

تساوي المساحة تحت (ع = ع_١)

مثال (٢)



استخدم جدول التوزيع الطبيعي المعياري في إيجاد نسبة المساحة في كل مما يأتي :

$$(١) \text{ عندما } (ع \geq ٠,٧٤) \quad (٢) \text{ عندما } (ع \geq -٢,٦٤)$$

$$(٣) \text{ عندما } (٢ \leq ع \leq ٣) \quad (٤) \text{ عندما } (ع \leq -٢,٥٢)$$


الحل:

$$(١) \text{ عندما } (ع \geq ٠,٧٤) \text{ فإن نسبة المساحة تحت } (ع = ٠,٧٤) = ٠,٧٧٠٤$$

ألاحظ أن المساحة المحصورة تحت $(ع = ٠,٧٤)$ تشكل ما نسبته $٧٧,٠٤\%$ من المساحة الكلية تحت المنحنى.

(لماذا؟)

$$(٢) \text{ عندما } (ع \geq -٢,٦٤) \text{ فإن نسبة المساحة تحت } (ع = -٢,٦٤) =$$




$$(٣) \text{ عندما } (٢ \leq ع \leq ٣) \text{ فإن نسبة المساحة بين } (ع = ٢, ع = ٣) =$$

$$= \text{المساحة تحت } (ع = ٣) - \text{المساحة تحت } (ع = ٢)$$

$$= ٠,٩٩٨٧ - ٠,٩٧٧٢ = ٠,٠٢١٥$$

ألاحظ أن المساحة المحصورة بين $ع = ٢$ و $ع = ٣$ تمثل ما نسبته $٢,١٥\%$ من المساحة الكلية تحت المنحنى.



$$(٤) \text{ عندما } (ع \leq -٢,٥٢) = \text{نسبة المساحة فوق } (ع = -٢,٥٢)$$

$$= ١ - \text{نسبة المساحة تحت } ع = -٢,٥٢$$

$$= ١ - ٠,٠٥٩ = ٠,٩٩٤١$$

$$\text{عندما } (ع \leq -٢,٥٢) \text{ تساوي } \underline{\hspace{2cm}}$$


تطبيقات على التوزيع الطبيعي المعياري:

تقدّم ١٠٠٠ طالب لامتحان ما في جامعة النجاح الوطنية. فإذا كانت علامات الطلبة تتبع التوزيع الطبيعي وسطه الحسابي ٦٠ وانحرافه المعياري ١٠. أجد:

(أ) النسبة المئوية للطلبة الذين تنحصر علاماتهم بين ٥٠، و ٩٠.

(ب) عدد الطلبة الذين علاماتهم تزيد عن ٨٠.

الحل:



(أ) أفرض أن z تمثل علامات الطلبة، حيث $\mu = 60$ ، $\sigma = 10$

$$\text{عندما } z = 50: \quad z = \frac{50 - 60}{10} = -1$$

$$\text{عندما } z = 90: \quad z = \frac{90 - 60}{10} = 3$$

إذن النسبة التي تمثل $(50 \leq z \leq 90)$ = نسبة المساحة عندما $(-1 \leq z \leq 3)$

$$= (\text{المساحة تحت } z = 3) - (\text{المساحة تحت } z = -1)$$

$$= 0.9987 - 0.1054 = 0.8933$$

إذن النسبة المئوية = $0.8933 \times 100\% = 89.33\%$

$$\text{(ب) عندما } z = 80: \quad z = \frac{80 - 60}{10} = 2$$


إذن النسبة التي تمثل $(z \leq 80)$ = نسبة المساحة فوق $(z = 2)$

$$= 1 - (\text{المساحة تحت } z = 2)$$

$$= 1 - 0.9772 = 0.0228$$

النسبة المئوية = $0.0228 \times 100\% = 2.28\%$

إذن عدد الطلبة = $1000 \times 0.0228 \approx 23$ طالباً.



تمارين ومسائل (٤ - ٢)



١ استخدم جدول التوزيع الطبيعي المعياري في إيجاد نسبة المساحة لكل من الآتية:

أ) عندما $(٠,٣٤ \geq ع)$ ب) عندما $(١,٦٤ \leq ع)$ ج) عندما $(٢- \geq ع \geq ١,٦٧)$

٢ إذا كان عمر التشغيل لبطارية سيارة من إنتاج مصنع فلسطيني يتبع التوزيع الطبيعي، بوسط حسابي ٢٠٠٠ ساعة، وانحراف المعياري ١٢٠ ساعة، ما النسبة المئوية للبطاريات التي يكون عمر التشغيل لها أكثر من ١٨٢٠ ساعة؟

٣ خط إنتاج في مصنع ينتج ٤٠٠ كيس من السكر تتبع توزيعاً طبيعياً بوسط حسابي يساوي ١,٠١ كغم وانحراف معياري يساوي ٠,٠٢ كغم . أجب:

أ) النسبة المئوية للأكياس التي كتلتها أقل من ١,٠٣ كغم من إنتاج هذا الخط.

ب) عدد الأكياس التي كتلتها أكثر من ١,٠٢ كغم.

ج) النسبة المئوية للأكياس التي تتراوح كتلتها بين ١ كغم و ١,٠٥ كغم.

٤ تقدم ١٠٠٠ طالب في إحدى الجامعات الفلسطينية لامتحان عام في المهارات التقنية. وكانت علاماتهم تتبع التوزيع الطبيعي بوسط حسابي يساوي ٦٨ وانحراف معياري ٥، فإذا كان عدد الطلبة الذين حصلوا على علامة ٦٠ على الأقل هو ٧١٩ طالب.

أ) ما قيمة ٥؟

ب) ما النسبة المئوية للطلبة الذين حصلوا على علامة ٤٠ على الأقل؟

ج) ما عدد الطلبة الذين حصلوا على علامة ٧٠ على الأكثر؟

تمارين عامة

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل من الأسئلة الآتية:

(١) إذا كان الوسط الحسابي لمجموعة من العلامات يساوي ٥٦ والانحراف المعياري يساوي ٤ فما العلامة التي تنحرف انحرافين معياريين تحت الوسط؟

- (أ) ٥٧ (ب) ٤٨ (ج) ١٢ (د) ١٢-

(٢) إذا كان الفرق بين طولي شخصين يساوي ١٥ سم، والفرق بين العلامتين المعياريتين المناظرتين لطوليهما يساوي ١,٥ ، فما الانحراف المعياري σ ؟

- (أ) ١٥ (ب) ١,٥ (ج) ١٠ (د) ٠,٧٥

(٣) إذا كانت كتلتا شخصين ٨٥ كغم ، ٨٠ كغم، وكانت العلامتان المعياريتان المناظرتان لهما ١، -٢ على الترتيب فما الانحراف المعياري؟

- (أ) ١ (ب) $\frac{3}{5}$ (ج) $\frac{5}{3}$ (د) ١٠

(٤) إذا كانت ع تتبع التوزيع الطبيعي وكانت المساحة عندما $(ع < ٢,٢٣) = ك$ ما نسبة المساحة عندما $(ع < -٢,٢٣)$ ؟

- (أ) ك (ب) ١ - ك (ج) ك - ١ (د) ١ + ك

(٥) إذا كانت س تتبع التوزيع الطبيعي بوسط الحسابي μ وانحراف معياري σ ، ما قيمة المساحة الممكنة عندما $(س < \mu)$ ؟

- (أ) ٠,٥٠ (ب) ٠,٥٠ (ج) ١ (د) صفر

السؤال الثاني: إذا كان ع يتبع التوزيع الطبيعي، أجد نسبة المساحة في كل مما يأتي:

- (أ) عندما $(ع \leq ١,١٣)$ (ب) عندما $(ع \geq ١,٤٢)$

- (ج) عندما $(١,٣٥ \leq ع \leq ٢,٠١)$ (د) عندما $(١,٤١ \leq ع \leq ٢,٤٥)$

السؤال الثالث: إذا كان الوسط الحسابي لمجموعة من المفردات يساوي ٥٠ والانحراف المعياري لها ١٠ أجد:

(أ) العلامة المعيارية المناظرة للمفردة ٦٠

(ب) المفردة المناظرة للعلامة المعيارية -١,٥

السؤال الرابع: إذا كانت س تمثل علامات طلبة صف ما بحيث س تتبع التوزيع الطبيعي حيث أن الوسط

الحسابي يساوي ٢٠ والانحراف المعياري يساوي ٤

أجد كلاً مما يأتي:

(أ) نسبة المساحة عندما $(س \leq ١٦)$

(ب) نسبة المساحة عندما $(س \geq ٩)$

السؤال الخامس: إذا كانت العلامتان المعياريتان المناظرتان للعلامتين ١٧ ، ٣٥ هما -١، ٣ على الترتيب،

فما الوسط الحسابي والانحراف المعياري للعلامات الخام؟

السؤال السادس: صفّ مكون من ٤٠ طالباً، إذا كانت علامات الطلاب رامي، محمد ، رائد هي ٨٠ ، ٩٠ ، س

على الترتيب، وعلاماتهم المعيارية المناظرة هي: ٢ ، ٣ ، -١ على الترتيب، فما قيمة س؟

السؤال السابع: أقيم ذاتي: أكمل الجدول الآتي:

مستوى الانجاز			مؤشر الاداء
مرتفع	متوسط	دون المتوسط	
			ايجاد العلامة المعيارية
			ايجاد المساحة تحت المنحنى الطبيعي
			حل مسائل منتمية لايجاد كل من الوسط والانحراف المعياري
			توظيف المنحنى الطبيعي في حل مشكلات حياتية

إجابات التمارين والمسائل

الوحدة الأولى

تمارين (١-١) صفحـ(٩)ة

- ١ (أ) ٢- (ب) ٧ (ج) $\frac{1}{7}$
- ٢ (٣) ١٥ (٤) ١- (٥) ٤ (٦) $\frac{5}{8}$

تمارين (٢-١) صفحـ(١٣)ة

- ١ (أ) ٠ (ب) ٣ (ج) ١ (د) $\frac{5}{3}$ (هـ) ٣
- ٢ (أ) $\frac{64}{6}$ (ب) ٠ (ج) ٢٠س^٢ (د) ٤٢ (٥) ٤

تمارين (٣-١) صفحـ(١٩)ة

- ١ (أ) صفر (ب) ١٠ (ج) $\frac{5}{3}$ (د) ٣-
- ٢ (أ) ١- (ب) $\frac{4س - 3س^2 + 21}{2(3س - 2)}$ (ج) $\frac{2س - 3}{3}$ (د) ٤٩-
- ٣ (٤) $\frac{5}{9}$ (٥) ١٦- (٦) ١- (٧) ٣
- ٤ (٥) ١- (٦) ١- (٧) ٣

تمارين (٤-١) صفحـ(٢٤)ة

- ١ ق(٢-) = ٦ عظمى محلية ، ق(٠) = ١ صغرى محلية
- ٢ أ) ق(س) متزايد على $[-١, \infty]$ ، ومتناقص على الفترة $[-\infty, ١]$
ب) للاقتزان ق(س) قيمة صغرى محلية عند $s = ١$ وقيمتها -٤
- ٣ ٤- ٤ الاقتران هـ(س) متزايد على الفترة $[-\infty, ٢]$ ومتناقص على الفترة $[-\infty, ٢]$.
- ٥ أ) الاقتران ك(س) متزايد على $[-\infty, ٥]$ ، $U [١, \infty]$ ومتناقص على $[-١, ٥]$.
ب) للاقتزان ك(س) قيمة عظمى محلية عند $s = ٥$ وقيمتها $\frac{٨٥}{٣}$ ، وله قيمة صغرى محلية عند $s = ١$ وقيمتها $-\frac{٢٣}{٣}$
- ٦ ع/س) موجبة على ح

تمارين (٥-١) صفحـ(٣٠)ة

- ١ أ) $s^٣ + ٢s^٢ - ٥s + ج$ ب) $\frac{s^٥}{٧} + ج$ ج) $\frac{s^٧}{٨} + ج$
- ٢ ٥ ٣ $s^٦ + ٢$ ٤ $s^٣ + ٣$
- ٥ أ) ق(س) = $s^٣ + ٨s + ١$ ب) ص = $٢٠s + ١٧$
- ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

تمارين (٦-١) صفحـ(٣٧)ة

- ١ أ) $\frac{٣}{٢} -$ ب) صفر ج) $\frac{٤١}{٣}$
- ٢ ١٦- ٣ ٢٤- ٤ ٢- ٥ ١± ٦ ٣٣ ٧ ٢٤



تمارين عامة صفحـ(٣٨)ة

١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	رقم الفقرة
ب	ج	د	ج	أ	ج	ج	أ	أ	د	إجابة الفقرة

١

٥ - ٣ ، ٢

٤ - ٢ ، ٢

٣ $\frac{1}{7}$

٢ ١٢

٦ أ) متزايد على الفترة $[1, \infty)$ ومتناقص على $[-\infty, 1]$.

ب) للاقتزان هـ(س) قيمة صغرى محلية عند $s = 1$ وقيمتها -٣ .

الوحدة الثانية

تمارين (١-٢) صفحـ(٤٨)ة

$$\begin{bmatrix} 230 & 470 & 500 \\ 180 & 250 & 400 \end{bmatrix}$$

١

٢ أ) رتبة المصفوفة أ هي 2×3 . رتبة المصفوفة ب هي 3×3 . رتبة المصفوفة ج هي 3×1 .

ب) المصفوفة P صفرية ، المصفوفة ب مربعة ، المصفوفة ج مصفوفة صف .

$$\text{ج) } 3 = {}_{11}P, 0 = {}_{11}P, 8 = {}_{11}P$$

٣ أ) جـ = -٤ ، ب = -٣ . ب) . جـ = ٩ ، ب = -٢ . ج) جـ = ± 3 ، ب = ٠ ، ب = ١

٤ س = ٣ ، ص = ١

تمارين (٢-٢) صفحـ (٥٧)ـة

$$\begin{bmatrix} ٢ \\ ٥ \\ ٦ \end{bmatrix} \text{ (ج)}$$

(ب) ٣٨

$$\begin{bmatrix} ٣٠ \\ ٢٠ \\ ١٦ \end{bmatrix} = \text{ب} , \begin{bmatrix} ٣٢ \\ ٢٥ \\ ٢٢ \end{bmatrix} = \text{أ}$$

١٠

$$\begin{bmatrix} ١٤ & ٦- & ١١- & ٤- \\ ٢٣- & ٢١- & ١- & ١٠ \end{bmatrix} = \text{ب} \text{ (ب) } ٣ \text{ س} - ٤ \text{ ص} , \begin{bmatrix} ٧ & ٥ & ٨ & ١٥ \\ ١١ & ٧ & ٩ & ٨ \end{bmatrix} = \text{أ} \text{ (أ) } \text{س} + \text{ص}$$

$$\begin{bmatrix} ٢ & ٦ & ١٠ & ١٤ \\ ١٦ & ١٢ & ٨ & ٤ \end{bmatrix} \text{ (ج) } ٥ \text{ ص} - \text{س} = \begin{bmatrix} ١- & ١٣ & ٢٢ & ٢٧ \\ ٣٧ & ٢٩ & ١٥ & ٤ \end{bmatrix} , \text{ (د) } ٢ \text{ س} \text{ لا يمكن لاختلاف الرتب} , \text{ (هـ) } \begin{bmatrix} ٢ & ٦ & ١٠ & ١٤ \\ ١٦ & ١٢ & ٨ & ٤ \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} ٧ & ٥- \\ ٢ & ١٠- \\ ١- & ١١- \\ ١١- & ٢ \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} ٣- & ٢- & ١١ \\ ١٥ & ٦ & ١٥ \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} ٥ & ١ \\ ١ & ٢- \\ ١ & ٠ \end{bmatrix} \text{ (ج)}$$

$$\begin{bmatrix} ١٠ & ٦- \\ ١٤- & ٢- \end{bmatrix} \text{ (ب)}$$

$$\begin{bmatrix} ٧- & ٦ \\ ٢- & ١٦- \end{bmatrix} \text{ (أ)}$$

تمارين (٣-٢) صفحـ (٦٢)ـة

$$\begin{bmatrix} ٢١٩٠٠ \\ ٢٨٤٠٠ \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} ١١ & ٣٩ \\ ٣٣ & ٤ \end{bmatrix} \text{ (ب)}$$

$$\begin{bmatrix} ٥- & ٥٢ & ١٠- \end{bmatrix} \text{ (أ)}$$

$$\text{أ} = ١ , \text{ب} = ٩$$

$$\begin{bmatrix} ٨٠ \\ ١٠٠ \\ ٠ \end{bmatrix} \text{ (ج)}$$

$$\begin{bmatrix} ٨٠ \\ ١٠٠ \\ ٠ \end{bmatrix} \text{ (ب)}$$

$$\begin{bmatrix} ٨٠ \\ ١٠٠ \\ ٠ \end{bmatrix} \text{ (أ)}$$

تمارين (٢-٤) صفحـ(٧٠)ة

١ س = ٢

٢ - ٢٠

(ج) لا يوجد لها نظير ضربي

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} = \text{ب}^{-1}$$

٣ (أ) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 7 \end{bmatrix} = \text{ب}^{-1}$

(ب) $\begin{bmatrix} 2 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{س} \\ \text{ص} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

٤ (أ) $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{س} \\ \text{ص} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$

(ب) $\begin{bmatrix} 29 & 17 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$

٥ (أ) $\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 14 \end{bmatrix} = \text{س}$

(ب) س = ٥ ، ص = ١

٦ (أ) س = ٣ ، ص = ١

تمارين (٢-٥) صفحـ(٧٤)ة

١ س = ١ ، ص = ٢

٢ (أ) س = ٨ ، ص = ٤

(ب) س = ٥ ، ص = ٢

تمارين عامة (٢) صفحـ(٧٥)ة

١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	رقم الفقرة
ب	أ	ج	ب	ب	د	أ	ب	ب	د	إجابة الفقرة

٣ س = ٢ ، ص = ٣

٢ (ب + ج) $\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} ١- & ٥- \\ ٤ & ٢ \end{bmatrix} \textcircled{٦}$$

$$\textcircled{٥} \text{ س } = ١ ، \text{ س } = ٣$$

$$\textcircled{٤} \text{ س } = \frac{١}{٢} ، \text{ ص } = \frac{٣}{٢}$$

الوحدة الثالثة

تمارين (١-٣) صفحـ(٨١)ة

$$\textcircled{١} \text{ أ } \{١\} \quad \text{ب } \left\{ \frac{٤}{٣} \right\} \quad \text{ج } \{٢\}$$

$$\textcircled{٢} \text{ أ } \left\{ \frac{٧}{٦} \right\} \quad \text{ب } \{٣\} \quad \text{ج } \{٢\}$$

تمارين (٢-٣) صفحـ(٨٤)ة

$$\textcircled{١} \text{ أ } \{٤\} \quad \text{ب } \{٢\} \quad \text{ج } \{-٢١\} \quad \text{د } \{-٤، ١\} \quad \text{هـ } \{١\}$$

$$\textcircled{٢} \quad ٢ \pm \quad \textcircled{٣} \quad \frac{١٤}{٥}$$

تمارين (٣-٣) صفحـ(٨٨)ة

$$\text{ب } (١، ٤، ٩، ١٦)$$

$$\textcircled{١} \text{ أ } \frac{١}{٣} + ١ + \frac{٩}{٥} + \frac{٨}{٣}$$

جـ) غير منتهية

بـ) منتهية

أـ) غير منتهية

٣ (أ) ٩٥

٣٢ (ب)

ج) $\frac{٢٨٢٣}{٤٢٠}$

٤ (٤) ١٦

تمارين (٤-٣) صفحـ(٩٤)ـة

١ (أ) $١٣ + ١٠ + ٧ + ٤$

ب) $١٦ + ٨ + ٤ + ٢$

٢ (٢) ١٢٣٠

٣ (٣) ٥٧-

٤ (٤) ٣

٥ (٥) ٢٧٠٠

تمارين (٥-٣) صفحـ(٩٨)ـة

١ (أ) ٢٤٠

ب) ٧٨١

ج) $\frac{٥١}{١٦}$

٢ (٢) ٠

٣ (٣) ٤

٤ (٤) ٤

تمارين عامة (٣) صفحـ(٩٩)ة

٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	رقم الفقرة
ج	د	ج	ب	أ	ب	أ	د	إجابة الفقرة

١

٤ $\varepsilon = 5, 3 = 1$

٣ ٦

٢ $10 + 5 + 1 + 5 - 10$

٧ $\frac{3}{4}$ (ب) ٣ (أ)

٦ $\frac{13}{4} - \frac{4}{5}$ (ب)

٥ 11750 (أ) 117250 (ب)

٨ $3 - 2 - 1$

الوحدة الرابعة

تمارين (١-٤) صفحـ (١٠٧)ـة

١ ع = ٢

٢ ع = ٢٠

٣ س = ١٥٦

٤ أ) $\sigma = \frac{5}{2}$ ، س = ٤٥

ب) $\frac{16}{5}$

تمارين (٢-٤) صفحـ (١١٣)ـة

ج) ٠,٩٢٩٧

ب) ٠,٩٤٩٥

١ أ) ٠,٦٣٣١

٣ $\sigma = ١٠$

٢ ٩٣,٣٢ %

ج) ٦٦,٨٧ %

ب) ١٢٣

٤ أ) ٨٤,١٣ %

ج) ٥٦٠ طالب تقريباً

ب) ٩٧,٨٨ %

٥ أ) $\sigma = ١٣,٨$

تمارين عامة صفحـ(١١٤)ة

٥	٤	٣	٢	١
ب	ب	ج	ج	ب

١

٠,٩١٣٦ (د)

٠,٨٨٩٣ (ج)

٠,٩٢٢٢ (ب)

٠,١٢٩٢ (أ) ٢

٠,٠٠٣ (ب)


٠,٨٤١٣ (أ) ٤

٣٥ (ب)

١ (أ) ٣

٥٠ ٦

٤,٥ = σ ، ٢١,٥ = μ ٥



ملحق: جدول التوزيع الطبيعي المعياري التراكمي

ع	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٢	٠,٠٣	٠,٠٤	٠,٠٥	٠,٠٦	٠,٠٧	٠,٠٨	٠,٠٩
٣,٧-	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠١
٣,٦-	٠,٠٠٠٢	٠,٠٠٠٢	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠١
٣,٥-	٠,٠٠٠٢	٠,٠٠٠٢	٠,٠٠٠٢	٠,٠٠٠٢	٠,٠٠٠٢	٠,٠٠٠٢	٠,٠٠٠٢	٠,٠٠٠٢	٠,٠٠٠٢	٠,٠٠٠٢
٣,٤-	٠,٠٠٠٣	٠,٠٠٠٣	٠,٠٠٠٣	٠,٠٠٠٣	٠,٠٠٠٣	٠,٠٠٠٣	٠,٠٠٠٣	٠,٠٠٠٣	٠,٠٠٠٣	٠,٠٠٠٣
٣,٣-	٠,٠٠٠٥	٠,٠٠٠٥	٠,٠٠٠٥	٠,٠٠٠٤	٠,٠٠٠٤	٠,٠٠٠٤	٠,٠٠٠٤	٠,٠٠٠٤	٠,٠٠٠٤	٠,٠٠٠٣
٣,٢-	٠,٠٠٠٧	٠,٠٠٠٧	٠,٠٠٠٦	٠,٠٠٠٦	٠,٠٠٠٦	٠,٠٠٠٦	٠,٠٠٠٦	٠,٠٠٠٥	٠,٠٠٠٥	٠,٠٠٠٥
٣,١-	٠,٠٠١٠	٠,٠٠٠٩	٠,٠٠٠٩	٠,٠٠٠٩	٠,٠٠٠٨	٠,٠٠٠٨	٠,٠٠٠٨	٠,٠٠٠٨	٠,٠٠٠٧	٠,٠٠٠٧
٣,٠-	٠,٠٠١٣	٠,٠٠١٣	٠,٠٠١٣	٠,٠٠١٢	٠,٠٠١٢	٠,٠٠١١	٠,٠٠١١	٠,٠٠١١	٠,٠٠١٠	٠,٠٠١٠
٢,٩-	٠,٠٠١٩	٠,٠٠١٨	٠,٠٠١٨	٠,٠٠١٧	٠,٠٠١٦	٠,٠٠١٦	٠,٠٠١٥	٠,٠٠١٥	٠,٠٠١٤	٠,٠٠١٤
٢,٨-	٠,٠٠٢٦	٠,٠٠٢٥	٠,٠٠٢٤	٠,٠٠٢٣	٠,٠٠٢٣	٠,٠٠٢٢	٠,٠٠٢١	٠,٠٠٢١	٠,٠٠٢٠	٠,٠٠١٩
٢,٧-	٠,٠٠٣٥	٠,٠٠٣٤	٠,٠٠٣٣	٠,٠٠٣٢	٠,٠٠٣١	٠,٠٠٣٠	٠,٠٠٢٩	٠,٠٠٢٨	٠,٠٠٢٧	٠,٠٠٢٦
٢,٦-	٠,٠٠٤٧	٠,٠٠٤٥	٠,٠٠٤٤	٠,٠٠٤٣	٠,٠٠٤١	٠,٠٠٤٠	٠,٠٠٣٩	٠,٠٠٣٨	٠,٠٠٣٧	٠,٠٠٣٦
٢,٥-	٠,٠٠٦٢	٠,٠٠٦٠	٠,٠٠٥٩	٠,٠٠٥٧	٠,٠٠٥٥	٠,٠٠٥٤	٠,٠٠٥٢	٠,٠٠٥١	٠,٠٠٤٩	٠,٠٠٤٨
٢,٤-	٠,٠٠٨٢	٠,٠٠٨٠	٠,٠٠٧٨	٠,٠٠٧٥	٠,٠٠٧٣	٠,٠٠٧١	٠,٠٠٦٩	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٦	٠,٠٠٦٤
٢,٣-	٠,٠١٠٧	٠,٠١٠٤	٠,٠١٠٢	٠,٠٠٩٩	٠,٠٠٩٦	٠,٠٠٩٤	٠,٠٠٩١	٠,٠٠٨٩	٠,٠٠٨٧	٠,٠٠٨٤
٢,٢-	٠,٠١٣٩	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٢	٠,٠١٢٩	٠,٠١٢٥	٠,٠١٢٢	٠,٠١١٩	٠,٠١١٦	٠,٠١١٣	٠,٠١١٠
٢,١-	٠,٠١٧٩	٠,٠١٧٤	٠,٠١٧٠	٠,٠١٦٦	٠,٠١٦٢	٠,٠١٥٨	٠,٠١٥٤	٠,٠١٥٠	٠,٠١٤٦	٠,٠١٤٣
٢,٠-	٠,٠٢٢٨	٠,٠٢٢٢	٠,٠٢١٧	٠,٠٢١٢	٠,٠٢٠٧	٠,٠٢٠٢	٠,٠١٩٧	٠,٠١٩٢	٠,٠١٨٨	٠,٠١٨٣
١,٩-	٠,٠٢٨٧	٠,٠٢٨١	٠,٠٢٧٤	٠,٠٢٦٨	٠,٠٢٦٢	٠,٠٢٥٦	٠,٠٢٥٠	٠,٠٢٤٤	٠,٠٢٣٩	٠,٠٢٣٣
١,٨-	٠,٠٣٥٩	٠,٠٣٥١	٠,٠٣٤٤	٠,٠٣٣٦	٠,٠٣٢٩	٠,٠٣٢٢	٠,٠٣١٤	٠,٠٣٠٧	٠,٠٣٠١	٠,٠٢٩٤
١,٧-	٠,٠٤٤٦	٠,٠٤٣٦	٠,٠٤٢٧	٠,٠٤١٨	٠,٠٤٠٩	٠,٠٤٠١	٠,٠٣٩٢	٠,٠٣٨٤	٠,٠٣٧٥	٠,٠٣٦٧
١,٦-	٠,٠٥٤٨	٠,٠٥٣٧	٠,٠٥٢٦	٠,٠٥١٦	٠,٠٥٠٥	٠,٠٤٩٥	٠,٠٤٨٥	٠,٠٤٧٥	٠,٠٤٦٥	٠,٠٤٥٥
١,٥-	٠,٠٦٦٨	٠,٠٦٥٥	٠,٠٦٤٣	٠,٠٦٣٠	٠,٠٦١٨	٠,٠٦٠٦	٠,٠٥٩٤	٠,٠٥٨٢	٠,٠٥٧١	٠,٠٥٥٩
١,٤-	٠,٠٨٠٨	٠,٠٧٩٣	٠,٠٧٧٨	٠,٠٧٦٤	٠,٠٧٤٩	٠,٠٧٣٥	٠,٠٧٢١	٠,٠٧٠٨	٠,٠٦٩٤	٠,٠٦٨١
١,٣-	٠,٠٩٦٨	٠,٠٩٥١	٠,٠٩٣٤	٠,٠٩١٨	٠,٠٩٠١	٠,٠٨٨٥	٠,٠٨٦٩	٠,٠٨٥٣	٠,٠٨٣٨	٠,٠٨٢٣
١,٢-	٠,١١٥١	٠,١١٣١	٠,١١١٢	٠,١٠٩٣	٠,١٠٧٥	٠,١٠٥٦	٠,١٠٣٨	٠,١٠٢٠	٠,١٠٠٣	٠,٠٩٨٥
١,١-	٠,١٣٥٧	٠,١٣٣٥	٠,١٣١٤	٠,١٢٩٢	٠,١٢٧١	٠,١٢٥١	٠,١٢٣٠	٠,١٢١٠	٠,١١٩٠	٠,١١٧٠
١,٠-	٠,١٥٨٧	٠,١٥٦٢	٠,١٥٣٩	٠,١٥١٥	٠,١٤٩٢	٠,١٤٦٩	٠,١٤٤٦	٠,١٤٢٣	٠,١٤٠١	٠,١٣٧٩
٠,٩-	٠,١٨٤١	٠,١٨١٤	٠,١٧٨٨	٠,١٧٦٢	٠,١٧٣٦	٠,١٧١١	٠,١٦٨٥	٠,١٦٦٠	٠,١٦٣٥	٠,١٦١١
٠,٨-	٠,٢١١٩	٠,٢٠٩٠	٠,٢٠٦١	٠,٢٠٣٣	٠,٢٠٠٥	٠,١٩٧٧	٠,١٩٤٩	٠,١٩٢٢	٠,١٨٩٤	٠,١٨٦٧
٠,٧-	٠,٢٤٢٠	٠,٢٣٨٩	٠,٢٣٥٨	٠,٢٣٢٧	٠,٢٢٩٦	٠,٢٢٦٦	٠,٢٢٣٦	٠,٢٢٠٦	٠,٢١٧٧	٠,٢١٤٨
٠,٦-	٠,٢٧٤٣	٠,٢٧٠٩	٠,٢٦٧٦	٠,٢٦٤٣	٠,٢٦١١	٠,٢٥٧٨	٠,٢٥٤٦	٠,٢٥١٤	٠,٢٤٨٣	٠,٢٤٥١
٠,٥-	٠,٣٠٨٥	٠,٣٠٥٠	٠,٣٠١٥	٠,٢٩٨١	٠,٢٩٤٦	٠,٢٩١٢	٠,٢٨٧٧	٠,٢٨٤٣	٠,٢٨١٠	٠,٢٧٧٦
٠,٤-	٠,٣٤٤٦	٠,٣٤٠٩	٠,٣٣٧٢	٠,٣٣٣٦	٠,٣٣٠٠	٠,٣٢٦٤	٠,٣٢٢٨	٠,٣١٩٢	٠,٣١٥٦	٠,٣١٢١
٠,٣-	٠,٣٧٨٣	٠,٣٧٤٥	٠,٣٧٠٧	٠,٣٦٦٩	٠,٣٦٣٢	٠,٣٥٩٤	٠,٣٥٥٧	٠,٣٥٢٠	٠,٣٤٨٣	٠,٣٤٤٨
٠,٢-	٠,٤٢٠٧	٠,٤١٦٨	٠,٤١٢٩	٠,٤٠٩٠	٠,٤٠٥٢	٠,٤٠١٣	٠,٣٩٧٤	٠,٣٩٣٦	٠,٣٨٩٧	٠,٣٨٥٩
٠,١-	٠,٤٦٠٢	٠,٤٥٦٢	٠,٤٥٢٢	٠,٤٤٨٣	٠,٤٤٤٣	٠,٤٤٠٤	٠,٤٣٦٤	٠,٤٣٢٥	٠,٤٢٨٦	٠,٤٢٤٧
٠,٠	٠,٥٠٠٠	٠,٤٩٦٠	٠,٤٩٢٠	٠,٤٨٨٠	٠,٤٨٤٠	٠,٤٨٠١	٠,٤٧٦١	٠,٤٧٢١	٠,٤٦٨١	٠,٤٦٤١



٠,٠٩	٠,٠٨	٠,٠٧	٠,٠٦	٠,٠٥	٠,٠٤	٠,٠٣	٠,٠٢	٠,٠١	٠,٠٠	ع
٠,٥٣٥٩	٠,٥٣١٩	٠,٥٢٧٩	٠,٥٢٣٩	٠,٥١٩٩	٠,٥١٦٠	٠,٥١٢٠	٠,٥٠٨٠	٠,٥٠٤٠	٠,٥٠٠٠	٠,٠
٠,٥٧٥٣	٠,٥٧١٤	٠,٥٦٧٥	٠,٥٦٣٦	٠,٥٥٩٦	٠,٥٥٥٧	٠,٥٥١٧	٠,٥٤٧٨	٠,٥٤٣٨	٠,٥٣٩٨	٠,١
٠,٦١٤١	٠,٦١٠٣	٠,٦٠٦٤	٠,٦٠٢٦	٠,٥٩٨٧	٠,٥٩٤٨	٠,٥٩١٠	٠,٥٨٧١	٠,٥٨٣٢	٠,٥٧٩٣	٠,٢
٠,٦٥١٧	٠,٦٤٨٠	٠,٦٤٤٣	٠,٦٤٠٦	٠,٦٣٦٨	٠,٦٣٣١	٠,٦٢٩٣	٠,٦٢٥٥	٠,٦٢١٧	٠,٦١٧٩	٠,٣
٠,٦٨٧٩	٠,٦٨٤٤	٠,٦٨٠٨	٠,٦٧٧٢	٠,٦٧٣٦	٠,٦٧٠٠	٠,٦٦٦٤	٠,٦٦٢٨	٠,٦٥٩١	٠,٦٥٥٤	٠,٤
٠,٧٢٢٤	٠,٧١٩٠	٠,٧١٥٧	٠,٧١٢٣	٠,٧٠٨٨	٠,٧٠٥٤	٠,٧٠١٩	٠,٦٩٨٥	٠,٦٩٥٠	٠,٦٩١٥	٠,٥
٠,٧٥٤٩	٠,٧٥١٧	٠,٧٤٨٦	٠,٧٤٥٤	٠,٧٤٢٢	٠,٧٣٨٩	٠,٧٣٥٧	٠,٧٣٢٤	٠,٧٢٩١	٠,٧٢٥٧	٠,٦
٠,٧٨٥٢	٠,٧٨٢٣	٠,٧٧٩٤	٠,٧٧٦٤	٠,٧٧٣٤	٠,٧٧٠٤	٠,٧٦٧٣	٠,٧٦٤٢	٠,٧٦١١	٠,٧٥٨٠	٠,٧
٠,٨١٣٣	٠,٨١٠٦	٠,٨٠٧٨	٠,٨٠٥١	٠,٨٠٢٣	٠,٧٩٩٥	٠,٧٩٦٧	٠,٧٩٣٩	٠,٧٩١٠	٠,٧٨٨١	٠,٨
٠,٨٣٨٩	٠,٨٣٦٥	٠,٨٣٤٠	٠,٨٣١٥	٠,٨٢٨٩	٠,٨٢٦٤	٠,٨٢٣٨	٠,٨٢١٢	٠,٨١٨٦	٠,٨١٥٩	٠,٩
٠,٨٦٢١	٠,٨٥٩٩	٠,٨٥٧٧	٠,٨٥٥٤	٠,٨٥٣١	٠,٨٥٠٨	٠,٨٤٨٥	٠,٨٤٦١	٠,٨٤٣٨	٠,٨٤١٣	١,٠
٠,٨٨٣٠	٠,٨٨١٠	٠,٨٧٩٠	٠,٨٧٧٠	٠,٨٧٤٩	٠,٨٧٢٩	٠,٨٧٠٨	٠,٨٦٨٦	٠,٨٦٦٥	٠,٨٦٤٣	١,١
٠,٩٠١٥	٠,٨٩٩٧	٠,٨٩٨٠	٠,٨٩٦٢	٠,٨٩٤٤	٠,٨٩٢٥	٠,٨٩٠٧	٠,٨٨٨٨	٠,٨٨٦٩	٠,٨٨٤٩	١,٢
٠,٩١٧٧	٠,٩١٦٢	٠,٩١٤٧	٠,٩١٣١	٠,٩١١٥	٠,٩٠٩٩	٠,٩٠٨٢	٠,٩٠٦٦	٠,٩٠٤٩	٠,٩٠٣٢	١,٣
٠,٩٣١٩	٠,٩٣٠٦	٠,٩٢٩٢	٠,٩٢٧٩	٠,٩٢٦٥	٠,٩٢٥١	٠,٩٢٣٦	٠,٩٢٢٢	٠,٩٢٠٧	٠,٩١٩٢	١,٤
٠,٩٤٤١	٠,٩٤٢٩	٠,٩٤١٨	٠,٩٤٠٦	٠,٩٣٩٤	٠,٩٣٨٢	٠,٩٣٧٠	٠,٩٣٥٧	٠,٩٣٤٥	٠,٩٣٣٢	١,٥
٠,٩٥٤٥	٠,٩٥٣٥	٠,٩٥٢٥	٠,٩٥١٥	٠,٩٥٠٥	٠,٩٤٩٥	٠,٩٤٨٤	٠,٩٤٧٤	٠,٩٤٦٣	٠,٩٤٥٢	١,٦
٠,٩٦٣٣	٠,٩٦٢٥	٠,٩٦١٦	٠,٩٦٠٨	٠,٩٥٩٩	٠,٩٥٩١	٠,٩٥٨٢	٠,٩٥٧٣	٠,٩٥٦٤	٠,٩٥٥٤	١,٧
٠,٩٧٠٦	٠,٩٦٩٩	٠,٩٦٩٣	٠,٩٦٨٦	٠,٩٦٧٨	٠,٩٦٧١	٠,٩٦٦٤	٠,٩٦٥٦	٠,٩٦٤٩	٠,٩٦٤١	١,٨
٠,٩٧٦٧	٠,٩٧٦١	٠,٩٧٥٦	٠,٩٧٥٠	٠,٩٧٤٤	٠,٩٧٣٨	٠,٩٧٣٢	٠,٩٧٢٦	٠,٩٧١٩	٠,٩٧١٣	١,٩
٠,٩٨١٧	٠,٩٨١٢	٠,٩٨٠٨	٠,٩٨٠٣	٠,٩٧٩٨	٠,٩٧٩٣	٠,٩٧٨٨	٠,٩٧٨٣	٠,٩٧٧٨	٠,٩٧٧٢	٢,٠
٠,٩٨٥٧	٠,٩٨٥٤	٠,٩٨٥٠	٠,٩٨٤٦	٠,٩٨٤٢	٠,٩٨٣٨	٠,٩٨٣٤	٠,٩٨٣٠	٠,٩٨٢٦	٠,٩٨٢١	٢,١
٠,٩٨٩٠	٠,٩٨٨٧	٠,٩٨٨٤	٠,٩٨٨١	٠,٩٨٧٨	٠,٩٨٧٥	٠,٩٨٧١	٠,٩٨٦٨	٠,٩٨٦٤	٠,٩٨٦١	٢,٢
٠,٩٩١٦	٠,٩٩١٣	٠,٩٩١١	٠,٩٩٠٩	٠,٩٩٠٦	٠,٩٩٠٤	٠,٩٩٠١	٠,٩٨٩٨	٠,٩٨٩٦	٠,٩٨٩٣	٢,٣
٠,٩٩٣٦	٠,٩٩٣٤	٠,٩٩٣٢	٠,٩٩٣١	٠,٩٩٢٩	٠,٩٩٢٧	٠,٩٩٢٥	٠,٩٩٢٢	٠,٩٩٢٠	٠,٩٩١٨	٢,٤
٠,٩٩٥٢	٠,٩٩٥١	٠,٩٩٤٩	٠,٩٩٤٨	٠,٩٩٤٦	٠,٩٩٤٥	٠,٩٩٤٣	٠,٩٩٤١	٠,٩٩٤٠	٠,٩٩٣٨	٢,٥
٠,٩٩٦٤	٠,٩٩٦٣	٠,٩٩٦٢	٠,٩٩٦١	٠,٩٩٦٠	٠,٩٩٥٩	٠,٩٩٥٧	٠,٩٩٥٦	٠,٩٩٥٥	٠,٩٩٥٣	٢,٦
٠,٩٩٧٤	٠,٩٩٧٣	٠,٩٩٧٢	٠,٩٩٧١	٠,٩٩٧٠	٠,٩٩٦٩	٠,٩٩٦٨	٠,٩٩٦٧	٠,٩٩٦٦	٠,٩٩٦٥	٢,٧
٠,٩٩٨١	٠,٩٩٨٠	٠,٩٩٧٩	٠,٩٩٧٩	٠,٩٩٧٨	٠,٩٩٧٧	٠,٩٩٧٧	٠,٩٩٧٦	٠,٩٩٧٥	٠,٩٩٧٤	٢,٨
٠,٩٩٨٦	٠,٩٩٨٦	٠,٩٩٨٥	٠,٩٩٨٥	٠,٩٩٨٤	٠,٩٩٨٤	٠,٩٩٨٣	٠,٩٩٨٢	٠,٩٩٨٢	٠,٩٩٨١	٢,٩
٠,٩٩٩٠	٠,٩٩٩٠	٠,٩٩٨٩	٠,٩٩٨٩	٠,٩٩٨٩	٠,٩٩٨٨	٠,٩٩٨٨	٠,٩٩٨٧	٠,٩٩٨٧	٠,٩٩٨٧	٣,٠
٠,٩٩٩٣	٠,٩٩٩٣	٠,٩٩٩٢	٠,٩٩٩٢	٠,٩٩٩٢	٠,٩٩٩٢	٠,٩٩٩١	٠,٩٩٩١	٠,٩٩٩١	٠,٩٩٩٠	٣,١
٠,٩٩٩٥	٠,٩٩٩٥	٠,٩٩٩٥	٠,٩٩٩٤	٠,٩٩٩٤	٠,٩٩٩٤	٠,٩٩٩٤	٠,٩٩٩٤	٠,٩٩٩٣	٠,٩٩٩٣	٣,٢
٠,٩٩٩٧	٠,٩٩٩٦	٠,٩٩٩٦	٠,٩٩٩٦	٠,٩٩٩٦	٠,٩٩٩٦	٠,٩٩٩٦	٠,٩٩٩٥	٠,٩٩٩٥	٠,٩٩٩٥	٣,٣
٠,٩٩٩٨	٠,٩٩٩٧	٠,٩٩٩٧	٠,٩٩٩٧	٠,٩٩٩٧	٠,٩٩٩٧	٠,٩٩٩٧	٠,٩٩٩٧	٠,٩٩٩٧	٠,٩٩٩٧	٣,٤
٠,٩٩٩٨	٠,٩٩٩٨	٠,٩٩٩٨	٠,٩٩٩٨	٠,٩٩٩٨	٠,٩٩٩٨	٠,٩٩٩٨	٠,٩٩٩٨	٠,٩٩٩٨	٠,٩٩٩٨	٣,٥
٠,٩٩٩٩	٠,٩٩٩٩	٠,٩٩٩٩	٠,٩٩٩٩	٠,٩٩٩٩	٠,٩٩٩٩	٠,٩٩٩٩	٠,٩٩٩٩	٠,٩٩٩٨	٠,٩٩٩٨	٣,٦
٠,٩٩٩٩	٠,٩٩٩٩	٠,٩٩٩٩	٠,٩٩٩٩	٠,٩٩٩٩	٠,٩٩٩٩	٠,٩٩٩٩	٠,٩٩٩٩	٠,٩٩٩٩	٠,٩٩٩٩	٣,٧

أفكار رياضية

- * تصميم دليل ارشادي لمدينة القدس للتعريف باهميتها، مع ابراز اهم معالمها التاريخية والسياحية.
- * تصميم اداة لقياس اثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على تحصيل الطلبة .
- * تعاني المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) من مشكلات الماء والكهرباء ، اصمم مقترحا لعرضه على الحكومة للتخفيف من حدة هذه الازمات .
- * إعداد رحلات معرفية (Web quest) عن وحدة التفاضل.

المراجع

- الخطيب، روجي إبراهيم (٢٠١٢): التفاضل والتكامل ج ١، دار المسيرة، عمان .
- الخطيب، روجي إبراهيم (٢٠١٢): التفاضل والتكامل ج ٢، دار المسيرة، عمان .
- بسيوني، جابر أحمد (٢٠١٤): الإحصاء العام، دار الوفاء لدنيا الطباعة، الإسكندرية .
- عدنان عوض، أحمد علاونة، مفيد عزام، (١٩٩٠) -دار الفكر - عمان -الأردن
- حنيف، عاصم (١٩٩٩): حساب التفاضل والتكامل ، دار المعارف القاهرة
- خليفة عبد السميع (١٩٩٤)، تدريس الرياضيات في المدرسة الثانوية: الطبعة الثالثة، كلية التربية، جامعة القاهرة
- فريدريك بل (١٩٨٦): طرق تدريس الرياضيات: الجزء الأول (ترجمة محمد المفتي وممدوح سليمان). قبرص: الدار العربية للنشر والتوزيع
- فريدريك بل (١٩٨٦): طرق تدريس الرياضيات: الجزء الثاني (ترجمة محمد المفتي وممدوح سليمان). قبرص: الدار العربية للنشر والتوزيع
- ابو أسعد، صلاح عبد اللطيف (٢٠١٠): أساليب تدريس الرياضيات، الطبعة الاولى. دار الشروق للنشر والتوزيع
- الزغلول، عماد (٢٠٠٥): الإحصاء التربوي، الطبعة الاولى، دار الشروق للنشر والتوزيع.
- حسين فرج، عبد اللطيف (٢٠٠٥): طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة/ عمان

Bostock&Perkins(1989): Advanced Mathematics, volume1

Bell,E,T (1937):Men of Mathematics ,Simon and Schuter,N.Y

Lanl B.Boyer(1989): History of Mathematics Wiley,N.Y

Bostock&Perkins(1989): Advanced Mathematics, volume2

شكل من أشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة (أفراداً أو مجموعات) بسلسلة من ألوان النشاط التي يتمكنون خلالها من تحقيق أهداف ذات أهمية للقائمين بالمشروع. ويمكن تعريفه على أنه: سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد أو الجماعة لتحقيق أغراض واضحة ومحددة في محيط اجتماعي برغبة ودافعية.

مميزات المشروع:

١. قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ولا يتم دفعة واحدة.
٢. ينفذه فرد أو جماعة.
٣. يرمي إلى تحقيق أهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.
٤. لا يقتصر على البيئة المدرسية وإنما يمتد إلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.
٥. يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويشير دافعيتهم ورغبتهم بالعمل.

خطوات المشروع:

أولاً: اختيار المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما يأتي:

١. أن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.
٢. أن يوفر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.
٣. أن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.
٤. أن تكون المشروعات متنوعة ومتراصة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، لا تغلب مجالاً على الآخر.
٥. أن يتلاءم المشروع مع إمكانيات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.
٦. أن يُخطط له مسبقاً.

ثانياً: وضع خطة المشروع:

يتم وضع الخطة تحت إشراف المعلم حيث يمكن له أن يتدخل لتصويب أي خطأ يقع فيه الطلبة.

يقتضي وضع الخطة الآتية:

١. تحديد الأهداف بشكل واضح.
٢. تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.
٣. تحديد خطوات سير المشروع.
٤. تحديد الأنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، (شريطة أن يشترك جميع أفراد المجموعة في المشروع من خلال المناقشة والحوار وإبداء الرأي، بإشراف وتوجيه المعلم).
٥. تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلي.

ثالثاً: تنفيذ المشروع:

مرحلة تنفيذ المشروع فرصة لاكتساب الخبرات بالممارسة العملية، وتعدّ مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفره من الحرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على الإنجاز حيث يكون إيجابياً متفاعلاً خلاقاً مبدعاً، ليس المهم الوصول إلى النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.

دور المعلم:

١. متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدخل.
٢. إتاحة الفرصة للطلبة للتعلم بالأخطاء.
٣. الابتعاد عن التوتر مما يقع فيه الطلبة من أخطاء.
٤. التدخل الذكي كلما لزم الأمر.

دور الطلبة:

١. القيام بالعمل بأنفسهم.
٢. تسجيل النتائج التي يتم التوصل إليها.
٣. تدوين الملاحظات التي تحتاج إلى مناقشة عامة.
٤. تدوين المشكلات الطارئة (غير المتوقعة سابقاً).

رابعاً: تقييم المشروع: يتضمن تقييم المشروع الآتي:

١. الأهداف التي وضع المشروع من أجلها، ما تم تحقيقه، المستوى الذي تحقق لكل هدف، العوائق في تحقيق الأهداف إن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.
٢. الخطة من حيث وقتها، التعديلات التي جرت على الخطة أثناء التنفيذ، التقيد بالوقت المحدد للتنفيذ، ومرونة الخطة.
٣. الأنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنوعها، إقبال الطلبة عليها، توافر الإمكانيات اللازمة، التقيد بالوقت المحدد.
٤. تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث، الإقبال على تنفيذه بدافعية، التعاون في عملية التنفيذ، الشعور بالارتياح، إسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:

- أهداف المشروع وما تحقق منها.
- الخطة وما طرأ عليها من تعديل.
- الأنشطة التي قام بها الطلبة.
- المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.
- المدة التي استغرقها تنفيذ المشروع.
- الاقتراحات اللازمة لتحسين المشروع.

لجنة المناهج الوزارية

د. صبري صيدم	د. بصري صالح	م. فواز مجاهد
أ. ثروت زيد	أ. عزام أبو بكر	أ. عبد الحكيم أبو جاموس
د. شهناز الفار	د. سمية النخالة	م. جهاد دريدي

اللجنة الوطنية لوثيقة الرياضيات:

أ. ثروت زيد	د. محمد صالح (منسقاً)	د. معين جبر	د. علي عبد المحسن
د. تحسين المغربي	د. عادل فوارعة	أ. وهيب جبر	د. عبد الكريم ناجي
د. عطا أبوهاني	د. سعيد عساف	د. محمد مطر	د. علا الخليلي
د. شهناز الفار	د. علي نصار	د. أيمن الأشقر	أ. أرواح كرم
أ. حنان أبو سكران	أ. كوثر عطية	د. وجيه ضاهر	أ. فتحي أبو عودة
د. سمية النخالة	أ. أحمد سياعة	أ. قيس شبانة	أ. مبارك
أ. عبد الكريم صالح	أ. أحلام صلاح	د. نسرين دويكات	أ. نادية جبر
أ. نشأت قاسم			

المشاركون في ورشات عمل من كتاب الرياضيات للصف ثاني عشر الأدبي والشرعي

ابتسام اسليم	سميرة حنيف	مرام شماسنة
أرواح كرم	سناء الأشهب	مرشد شاهين
آسيا العلامي	سهى عودة	منال الصباغ
بيان بشارات	سهيل شبير	نادية زيد
حنان أبو حامد	صلاح الترك	نايف الطيطي
حنين قشوع	عبيدة الأجرب	نجلاء بكيرات
خلود طنوس	عدنان عنبوسي	نداء حسن
خليل محيسن	علي زايد	هاشم عبيد
رائد عبد العال	فوزية عودة	هديل حمودة
رائد ملاك	كريم العارضة	وائل عبيات
رفيق الصيفي	كمال الجمل	وسام موسى
سامر أبو الرب	ليديا جعينة	وفاء موسى
سامي بدر	محمد الغرابوي	ياسر الساحلي
حاتم الصغير	محمد فايز	أمجد الشامسطيني

تمت مناقشة الكتاب من قبل معلمين على مستوى مديريات الوطن عبر العديد من الورشات