



القسم الأول : يتكون هذا القسم من سؤالين وعلى الطالب الاجابة عليهما

السؤال الأول: (أ) انقل رمز الإجابة الصحيحة الى ورقة الاجابة فيما يأتي: (٤ علامات)

١. اذا كان متوسط التغير للاقتران $٧(س) = س^٣ - ٤س$ في $[-١, ١]$ يساوي (٥) جد قيمة الثابت ١ :
- أ. ٢ ب. ٣ ج. ٤ د. $٣ \pm$

٢. أجد $\frac{١ - ٢س}{١ - ٣س} = \frac{١ - ٢س}{١ - ٣س}$ لـ $١ - ٣س$ جد $١ - ٣س$:

- أ. صفر ب. -٥ ج. -٣ د. ٣

ب) اذا قطع المماس لمنحنى الاقتران $٧(س) = \frac{١ - ٢س}{٢ - س}$ ، $س > ٢$ وحدتين من محور الصادات الموجب

ووحدة واحدة من محور السينات الموجب ، جد معادلة المماس ؟ (٨ علامات)

ج) اذا كان $٧(س) = \begin{cases} ١ + ٢س - ٣س^٢, ٠ \leq س < ١ \\ ٤ - ٢س, ١ \leq س \leq ٢ \end{cases}$ وكان $٧(١)$ موجودة ،

جد قيمة الثوابت ١ ، ٢ ، ٣ ؟ (٨ علامات)

السؤال الثاني: (أ) انقل رمز الإجابة الصحيحة الى ورقة الاجابة فيما يأتي: (٤ علامات)

١. إذا علمت أن $٧(س) = \frac{١}{٢س - ١}$ ، $٧(س) = قاس$ ، $س \in [٠, \frac{\pi}{٢}]$ ، فجد $٧(٠)$ ؟

- أ. - قئاس ب. قئاس ج. - ظاس د. ظاس

٢. إذا كان $س = ٢ + ١$ ، $ع = ظا(١ - ص) + ٢ص$ ، أجد $\frac{ع}{س}$ لـ $س = ١$:

- أ. ٣ ب. -٣ ج. صفر د. ٤

ب) من قمة برج يرتفع عن سطح الارض (٦٠ م) ، أطلق جسم رأسيا لأعلى بحيث أن ارتفاعه ف بالأمتار عن قمة البرج بعد ٧ ثانية يعطى بالعلاقة $٧(٧) = ٧٢٠ - ٧٥٠$ ، جد ما يلي:-

أ) اقصى ارتفاع يصله الجسم عن سطح البرج ؟

ب) الزمن اللازم ليكون الجسم على ارتفاع (٧٥ م) من سطح الارض؟

ج) سرعة الجسم عندما يكون على ارتفاع (٣٥ م) من سطح الارض؟

(٨ علامات)

ج) جد فترات التزايد والتناقص لمنحنى الاقتران $٧(س) = س^٢ - ٣س + ٢$ على مجاله ؟ (٨ علامات)

القسم الثاني : يتكون هذا القسم من سؤالين وعلى الطالب الاجابة على سؤال واحد فقط

السؤال الثالث :- أ) انقل رمز الإجابة الصحيحة الى ورقة الاجابة فيما يأتي: (٤ علامات)

١. أجد عدد النقاط الحرجة للاقتزان $u(s) = \sqrt{s^2 - s} + 3s + 1$ ؟

- أ. ١ ب. ٢ ج. ٣ د. ٤

٢. إذا كان $u(s) = \frac{s + \left[\frac{1}{3}s - 2 \right]}{|s^2 + 2s|}$ ، $s \neq 0, 2$ ، جد $u'(1)$ ؟

- أ. غير موجودة ب. صفر ج. ١- د. ١

(٧ علامات)

ب) اذا كان جاص = طاس ، اثبت أن طاص = $\frac{ص''}{ص^2(ص) + 2}$ ؟


ج) يسير جسم في خط مستقيم بحيث أن العلاقة التي تربط سرعة جسم مع ازاحته تعطى بالعلاقة $ع^2 = ب \sqrt{ف}$ ، اذا كانت سرعة الجسم $٢٣ / ث$ عندما كان تسارعه $٢١ / ث$ ، جد قيمة الثابت ب ؟ (٤ علامات)

(٤ علامات)

السؤال الرابع :- أ) انقل رمز الإجابة الصحيحة الى ورقة الاجابة فيما يأتي:

١. إذا كان $u(s)$ كثير حدود وكان الشكل المجاور يمثل منحنى $u''(s)$ ، جد فترات

التناقص لمنحنى $u'(s)$ ؟



- أ. $\emptyset$ ب. $ع$ ج. $[0, \infty[$ د. $] \infty, 0]$

٢. جد قياس الزاوية التي يصنعها العمودي على المماس مع الاتجاه الموجب لمحور السينات لمنحنى العلاقة

$٢ص^2 + ٢س^2 - ٤س + ٢ص + ٤ = ٠$ ، عند النقطة $(٣, ١)$ ؟

- أ. ٦٠° ب. ١٨٠° ج. ٤٥° د. ١٣٥°

ب) اثبت أن متوسط التغير للاقتزان $u(s) = s^3 + s^2 - ٢س$ في الفترة $[١, ب]$ يساوي $(٢ + ب)$ ؟ (٤ علامات)

ج) اذا كان $u(s)$ اقتزانا قابلا للاشتقاق على $ع$ وكان $u(s) = (١ + s^3)$ ، $٣ + s^3 + ٢س$ ،

$u'(٢) = \frac{١}{٢}$ ، $٠ < u(s)$ ، جد قيمة الثابت ب ؟ (٧ علامات)

انتهت الاسئلة

بالتوفيق والتفوق

معلم المادة:- عوض محمد واوي

مدير المدرسة:- شادي عليان

.. حلول الامتحان ..

السؤال الأول

$$0 = \frac{(P - \omega \varepsilon - \omega^3(P - \varepsilon)) - (P \varepsilon - \omega^3 P)}{P \Gamma} \Leftarrow 0 = \frac{(P - \omega \varepsilon - \omega^3(P - \varepsilon)) - (P \varepsilon - \omega^3 P)}{P - P} = \frac{(P - \omega \varepsilon - \omega^3(P - \varepsilon)) - (P \varepsilon - \omega^3 P)}{\omega D}$$

$$0 = \frac{P \Gamma - \omega^3 P \Gamma}{P \Gamma} \Leftarrow 0 = \frac{P \varepsilon - \omega^3 P - P \varepsilon - \omega^3 P}{P \Gamma} \Leftarrow$$

$$\neq P \text{ و } 0 = \frac{(\varepsilon - P) \omega^3}{P \Gamma} \Leftarrow$$


✓ [363] $\Leftarrow \omega = P \Leftarrow 9 = \varepsilon P \Leftarrow 0 = \varepsilon - P \Leftarrow$
 أو [3-63] $\Leftarrow \omega = P$ مرفوضة X

$$0 \quad \omega = P \Leftarrow$$

$$\frac{\omega}{\varepsilon} = \frac{1 + 1 - \omega}{1 - 1} = \frac{1 + (\omega) - (1) \omega}{1 - (\omega)} = \frac{1 + \omega - (1 + \omega^3 - \omega^2)}{1 - \omega} \quad \Gamma$$

$$\frac{(\omega) + (\omega) + \left(\frac{\omega - \omega^3}{1 + \omega - \omega}\right)}{(\omega) \times (\omega)} = \frac{\omega \omega - \omega \omega^3 - \left(\frac{\omega - \omega^3}{1 + \omega^3 - \omega}\right)}{\omega \omega \times \omega} \quad \Gamma$$

$$0 \quad \omega = \frac{\omega - \omega^3}{1} = \frac{1 \times \omega + \omega - \omega^3}{1 \times \omega}$$



أ. م. حوارى

$$\Gamma > \omega \text{ و } \frac{1 - \omega}{\Gamma - \omega} = (\omega) \quad \Gamma$$

نفرض نقطة التماس (س) و (س)

يقطع المماس محور السينات في النقطة (س)

محور السينات في (س)

(س) (س)

$$\Gamma - \omega = \frac{\omega - \Gamma}{1 - \omega} = \frac{\omega D}{\omega D} = \text{مساحة المماس}$$

$$\frac{(1 - \omega) - (\omega \Gamma)(\Gamma - \omega)}{\Gamma(\Gamma - \omega)} = (\omega) \quad \Gamma$$

$$\frac{1 + \omega \varepsilon - \omega}{\varepsilon + \omega \varepsilon - \omega} = \frac{1 + \varepsilon - \omega \varepsilon - \omega \Gamma}{\Gamma(\Gamma - \omega)} = (\omega) \quad \Gamma$$

$$1 + \omega \Sigma - \epsilon \omega = 1 - \omega \Pi + \epsilon \omega \Gamma^- \Leftrightarrow \frac{1 + \omega \Sigma - \epsilon \omega}{\Sigma + \omega \Sigma - \epsilon \omega} = \Gamma^-$$

$$3 / (9 + \omega \Gamma^- - \epsilon \omega^2 = 4) \Leftrightarrow 3 + \omega \Sigma - \epsilon \omega = 4$$

$$(3 - \omega)(1 - \omega) = 1$$

$$\Gamma^- > \omega \times 3 = \omega \Leftrightarrow 4 = 3 - \omega \quad \checkmark \quad 1 = \omega \Leftrightarrow 1 = 1 - \omega$$

$$(1.61) \text{ نقطة التقاطع } \Leftrightarrow 1 = \frac{1-1}{\Gamma^- - 1} = (1) \text{ و } \Gamma^- = \rho$$

$$\frac{1}{\Gamma^-} = \text{ميل العمودي} \Leftrightarrow (\rho, \omega) = (1.61)$$

$$\Gamma^- + \omega \Gamma^- = \rho \Leftrightarrow (1 - \omega) \Gamma^- = \rho \Leftrightarrow (3 - \omega) \rho = \rho - \omega \quad / \text{ معادلة المماس}$$

$$\frac{1}{\Gamma^-} - \omega \frac{1}{\Gamma^-} = \rho \Leftrightarrow (1 - \omega) \frac{1}{\Gamma^-} = 1 - \rho \quad / \text{ معادلة العمودي}$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 \leq \omega \leq 1.61 \quad \rho + \omega \Gamma^- - \epsilon \omega^2 \\ \Gamma^- \geq \omega \geq 1 \quad \epsilon \omega \rho - \epsilon \end{array} \right\} = (3) \text{ و } \Gamma^-$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 \leq \omega \leq 1.61 \quad \omega \Gamma^- \\ \Gamma^- \geq \omega \geq 1 \quad \rho \Gamma^- \\ \Gamma^- \geq \omega \geq 1.61 \quad \rho \Gamma^- \end{array} \right\} = (3) \text{ و } \Gamma^-$$

$$\Gamma^- (1) \text{ موجودة } \Leftrightarrow \Gamma^- (1) = + \Gamma^- (1) \Leftrightarrow \Gamma^- (1) = \rho \Gamma^- \Leftrightarrow (1) - \rho \Gamma^- = 0$$

بما أنه $\Gamma^- (1)$ موجودة $\Leftrightarrow \Gamma^- (1)$ موجودة $\Leftrightarrow \Gamma^- (1)$ متصلة عند $\omega = 1$

$$3 / (\Gamma^- = \rho) \Leftrightarrow \Gamma^- - \rho \Gamma^- = 0 \Leftrightarrow \Gamma^- - \rho \Gamma^- = \rho \Gamma^- \Leftrightarrow \Gamma^- = \rho$$

$$\Gamma^- = \rho \Leftrightarrow \Gamma^- \times \Gamma^- = \rho \Gamma^- \quad / \text{ نعوّن ج في (1)}$$

$$(p + \omega \Gamma^- - \epsilon \omega^2) \big|_{\Gamma^- = \omega} = (\epsilon \omega \Gamma^- - \epsilon) \big|_{\Gamma^- = \omega} \Leftrightarrow 1 = \omega \text{ متصل عند } \omega = 1$$

$$\Gamma^- = \rho \Leftrightarrow p + \Gamma^- - \Gamma^- = \Gamma^- - \epsilon$$

السؤال الثاني

$$\text{قاس} = (\omega)$$

$$\text{قاس} = (\omega) \text{ قاس} = \text{قاس}$$

$$\text{قاس} = 1 + \omega \text{ قاس}$$

$$\text{قاس} - 1 = \omega \text{ قاس}$$

$$(\omega) \text{ قاس} \times (\omega) \text{ قاس} = (\omega) \text{ قاس}$$

$$\text{قاس} \times (\omega) \text{ قاس} =$$

$$\text{قاس} \times \frac{1}{(\omega) \text{ قاس}} =$$

$$\frac{\text{قاس}}{\text{قاس}} \times \frac{1}{\text{قاس}} = \frac{\text{قاس}}{\text{قاس} - 1} =$$

$$p \quad \text{قاس} = \frac{1}{\text{قاس}}$$

أ. م. حوار


$$\Gamma + (1 - \omega)\bar{b} = \frac{\xi \zeta}{\omega \sigma}$$

$$\begin{aligned} 1 + u\sigma &= u\omega & / \sigma \\ 1 &= u\sigma - u\omega \\ 1 &= (\sigma - \omega)u \\ \frac{1}{\sigma - \omega} &= u \end{aligned}$$

$$\frac{1}{r(r-w)} = \frac{wDS}{LWS}$$

أ.م.ي حواري

$$\left| \frac{1 - x(\Gamma + (1-u)\bar{c})}{c(\Gamma - u)} = \frac{ups}{lws} \times \frac{\$5}{ups} = \frac{\$5}{lws} \right.$$



۱۰/ $c_{No-n\pi} = (n)$ فی

$$n = n_1 - r_1 = \frac{f_0}{N} = 8$$

• $v = \Gamma \in v_1 = \Gamma \in$ زمان الصعود

١/ أقصى ارتفاع عند البرج = (ف/٢) = ٢٧٥ - ٢٧٢ = ٣

$$\mu_{r_i} = r_i - \Sigma_i =$$

١٢ الجسم على ارتفاع V_0 من الأرض $\leftarrow V_0 - 7.0 = 10$

الجسم في ارتفاع ٥٠ متر عن البرج

$$c_{N0} - n_1 = (n) \varphi$$

$$\dot{z} = W + N \Sigma - N \in \mathbb{R}^n / \dot{z} = 10 + N \Gamma_1 - N \sigma \in \mathbb{R}^n \quad N \sigma - N \Gamma_1 = 10$$

$$\dot{z} = (v - u)(1 - u)$$

اما $1 - N \in N$ ابيضاض

و $\{w_6\} = v \Leftrightarrow$ في المجموع $\cap w = v \Leftrightarrow \therefore w = v$ أو

٣/ الصمم في ارتفاع ٣٥ متر عن الأرض $\Rightarrow 70 - 35 = 35$ متر $\leftarrow$ تصب البرج

$$c_{NO-N\Gamma_1} = \Gamma_0 - \in (N)\phi = \Gamma_0 -$$

$$z = 0 - N\epsilon - N \leftarrow 0 / (z = \tau_0 - N\pi - N\sigma) \leftarrow$$

$$z = (0 - \nu)(1 + \nu)$$

$$U_0 = N \leftarrow$$

$$X|-\sim N$$

$$U_{1/2} = 0 \times 1 - 1 = -1$$

ج ١) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 1$ محالہ ٢ / $\{-2\}$ ٦ متصل حاصل طرح متصلہ
(٢ ٢ و للوئاسم ماخضہ < ٢)

$$w = \omega r + \epsilon_w \leftarrow \frac{r}{r+w} - \omega r \leftarrow \frac{(r+w) \cdot \frac{r}{r+w} - \epsilon_w}{r+w} = \frac{r - \epsilon_w}{r+w}$$

$$z = (v - \omega \Gamma + \zeta \omega) \in$$

$$\mu = \frac{w + \omega(1-w)}{1-w}$$

أ.م.ي حواری

لول ٩
 دائرة ٩
 السارية ٩

لاحظ أيضا، مقام قد في المجال
من اشارة قد :

• فرد (ن) متزانی $[F-63] \cup [0061]$

9) $\mu(\omega) = \frac{1}{\omega} \quad \omega \in (0, \infty)$

• السؤال الثالث :

$$] \psi_6] \in \omega_6 \quad \overline{(\omega - \xi_\omega)}^w = (\omega)_9 \quad \wedge \quad /P$$

$$\frac{1}{\Psi} (\omega - \xi \omega) = (\omega) \sim \theta$$

$$\therefore \frac{c}{\mu(\omega - \epsilon_0)\mu} = (1 - \alpha\omega r) \times \frac{1}{\mu} = (\omega) \phi$$

$$J^{\text{MGI}} \ni \frac{1}{\Gamma} = \omega \Gamma \Leftrightarrow 1 = \omega \Gamma^2 \Leftrightarrow \therefore 1 - \omega \Gamma \Leftarrow$$

$\mathbb{P}^1 \setminus \{0, 1, \infty\} \cong \mathbb{C} \setminus \{0, 1\} \cong \mathbb{C} \setminus \{0, 1, \infty\}$

٥. $\mathcal{C} = \{ \frac{1}{n} \}$ العدد $\mathcal{C} = \{ \frac{1}{n} \}$ $\mathcal{C}$

$$\Gamma \bar{\phi}_L \neq a \quad \frac{[\omega \frac{1}{\mu} - \Gamma] + a\omega}{|a\omega + \epsilon a|} = (a\omega) \rho \quad / \Gamma$$

الحل $|1 - \epsilon| = |r - 1| = |1 - \omega r + \epsilon|$

$$| \cdot | = \omega \text{ is } (\omega \Gamma + \varepsilon \omega) - \Gamma = \omega \Gamma + \varepsilon \omega \in$$

$$r = \left[\frac{1}{\mu} + r \right] = \frac{1}{1-\omega} \left[\omega \frac{1}{\mu} - r \right]$$

$$\Gamma - 6 \neq u - 6 \quad \frac{1-}{u} = \frac{(\Gamma+u)}{(\Gamma+u)(u)-} = \frac{\Gamma+u}{(u\Gamma+u)-} = (u)_{\theta} \Leftarrow$$

$$s \quad 1 = (-1)_{19} \in \frac{1}{u} = (u)_{19}$$

١٠ / جاب = طاس نشق ل ب

$$\begin{aligned} \text{جاب} \times \text{طاس} &= \text{قاس} \quad \text{نشق مرة ثانية ل ب} \\ \text{جاب} \times \text{طاس} &= \text{قاس} \times \text{طاس} - \text{قاس} + \text{قاس} \times \text{طاس} \\ (\text{قاس} \times \text{طاس}) - \text{قاس} &= \text{جاب} \times \text{طاس} \div \text{طاس} \end{aligned}$$

$$\text{قاس} \times \text{طاس} = \frac{\text{قاس} \times \text{طاس}}{\text{طاس}} = \frac{\text{قاس}}{1} = \text{قاس}$$

$$\text{قاس} = \frac{\text{قاس}}{1} = \text{قاس}$$

$$\text{قاس} + \text{قاس} = \frac{\text{قاس}}{1} \leftarrow \text{قاس} = \frac{\text{قاس}}{1} - \text{قاس}$$

$$\# \frac{\text{قاس}}{\text{قاس} + \text{قاس}} = \text{قاس} \leftarrow \frac{1}{\text{قاس} + \text{قاس}} = \frac{\text{قاس}}{\text{قاس}} \leftarrow$$

١ = ٣ عندما ٣ = ٤

٤ = ٣

$$\text{قاس} = \frac{4}{3} \leftarrow \text{قاس} = 4 \leftarrow \text{قاس} = 3 \leftarrow 3 = 4$$

٤ = ٣ نشق للزمن

$$\therefore \neq 4 \quad \frac{4 \times 3}{\text{قاس}} = \frac{4 \times 3}{\text{قاس}}$$

$$\text{قاس} = \frac{4 \times 3}{3} \leftarrow \frac{4}{\frac{4}{3} \times 3} = 1 \times 3 \leftarrow \frac{4}{\text{قاس}} = 3$$

$$\frac{4}{3} = \text{قاس}$$

$$7 = 0 \leftarrow 37 = 0$$

$$7 = 0 \leftarrow \text{مرفوض لأن } 7 \neq 37$$

السؤال الرابع

١٢

١ / تناقض قد $\leftarrow$ قد (س) د : $\leftarrow$ قد يعوضه معور السين
وض الشك قد فوفه معور السين $\leftarrow$ قد متزايد على 2 .

لا يوجد متراثر تناقض P

أ.مي حوارى

$$\begin{aligned} \dot{u} &= \Gamma + u\Gamma + u\Gamma - \dot{u}u + \dot{u}u \\ (1-\dot{u}) \dot{u} &= \dot{u}\Gamma + \Gamma - u\Gamma + \dot{u}u\Gamma \\ \dot{u} &= \dot{u}\Gamma + \Gamma - \Gamma + \dot{u}u\Gamma - \end{aligned}$$

$$\text{معدل المماس} = 1 - \dot{u} = \dot{u} \leftarrow \dot{u} = \dot{u} + \dot{u}u$$

$$\dot{u} = 0 \leftarrow \dot{u} = 1 = \text{معدل المماس على المماس}$$

$$\text{المعدل في نقطة زاوية} \dot{u} = 0 \text{ في } \dot{u}$$

$$u\Gamma - \dot{u}u + \dot{u}u = (u)\Gamma \quad / \dot{u}$$

$$\frac{(1)\Gamma - (u)\Gamma}{1-u} = \frac{(u)\Gamma - (u)\Gamma}{u - u} = \frac{(u)\Gamma D}{u D}$$

$$\frac{\Gamma - u\Gamma + \dot{u}u - \dot{u}u}{(1-u)} = \frac{(u\Gamma - \Gamma + \Gamma) - (\dot{u}u\Gamma - \dot{u}u + \dot{u}u)}{(1-u)} =$$

$$1 \neq u \quad \frac{(\Gamma + \dot{u}u)(1-u)}{(1-u)} = \frac{(1-u)\Gamma + (1-u)\dot{u}u}{(1-u)} =$$

$$\cancel{\Gamma + \dot{u}u} =$$

أ. م. حوارى

$$u + u\Gamma + \dot{u}u = (1 + \dot{u}u) \Gamma$$

$$1 = u \leftarrow 1 = \dot{u} \leftarrow \Gamma = 1 + \dot{u}u \quad / \text{نقطة}$$

$$1 = u \leftarrow u + u\Gamma + \dot{u}u = (1 + \dot{u}u) \Gamma$$

$$\Gamma + u = (\Gamma) \Gamma \leftarrow u + u + u = (\Gamma) \Gamma$$

$$\Gamma + u = (\Gamma) \Gamma$$

$$1 \quad u + u\Gamma = \dot{u}u \times (1 + \dot{u}u) \times (1 + \dot{u}u) \Gamma \quad \text{نقطة}$$

$$u + u\Gamma = u \times (\Gamma) \times (\Gamma) \Gamma$$

$$u + u\Gamma = u \times \frac{1}{\Gamma} \times \Gamma \Gamma$$

$$\Gamma (u + u\Gamma = \Gamma \Gamma)$$

$$u + u\Gamma + \dot{u}u = (1 + \dot{u}u) u$$

$$u + u\Gamma + \dot{u}u = 0u + u$$

$$\dot{u}u + u\Gamma + \dot{u}u = \dot{u}$$

$$(u - u)(1 + \dot{u}u) = \dot{u}$$

$$u = 0$$

$$\frac{1}{\Gamma} = 0$$



لتحميل المزيد من موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة

<http://www.sh-pal.com>

تابعنا على صفحة الفيس بوك: www.facebook.com/shamela.pal

تابعنا على قنوات التلجرام: www.sh-pal.com/p/blog-page_42.html

أقسام موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة:

الصف الأول: www.sh-pal.com/p/blog-page_24.html

الصف الثاني: www.sh-pal.com/p/blog-page_46.html

الصف الثالث: www.sh-pal.com/p/blog-page_98.html

الصف الرابع: www.sh-pal.com/p/blog-page_72.html

الصف الخامس: www.sh-pal.com/p/blog-page_80.html

الصف السادس: www.sh-pal.com/p/blog-page_13.html

الصف السابع: www.sh-pal.com/p/blog-page_66.html

الصف الثامن: www.sh-pal.com/p/blog-page_35.html

الصف التاسع: www.sh-pal.com/p/blog-page_78.html

الصف العاشر: www.sh-pal.com/p/blog-page_11.html

الصف الحادي عشر: www.sh-pal.com/p/blog-page_37.html

الصف الثاني عشر: www.sh-pal.com/p/blog-page_33.html

ملازم للمتقدمين للوظائف: www.sh-pal.com/p/blog-page_89.html

شارك معنا: www.sh-pal.com/p/blog-page_40.html

اتصل بنا: www.sh-pal.com/p/blog-page_9.html